




28,454/B

IV.C.98





# WAARNEEMINGEN

OMTRENT VERSCHEIDENE SOORTEN VAN

## ETTERZIEKTEN,

BENEVENS EENIGE PROEFNEEMINGEN EN AANMERKINGEN  
OVER DEN ETTER EN  
ANDERE DIERLIJKE  
VOGTEN.

D O O R

J. W. H E P P E,

*Stads Medicinæ Doctor en Lector te Campen.*

---

UITGEGEVEN

*door*

HET UTRECHTSCH GENOOTSCHAP  
VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.


---

Te U T R E C H T,

Bij B. WILD EN J. ALTHEER.

*Drukkers van het Utrechtsch Genootschap.*

1 8 0 2.





WAAHNTHEIM

ORIENTAL MUSEUM VAN VAN

ETTERKATEN

PERVENE ERKIC TROJEN

MANDARIN TROJEN

OVER DEN TROJEN

ANDEREN TROJEN

TROJEN

J. W. H. E. P. E.

Van der Waerden

ETTERKATEN

ETTERKATEN

ETTERKATEN

ETTERKATEN




ETTERKATEN

ETTERKATEN

ETTERKATEN

ETTERKATEN





# WAARNEEMINGEN

OMTRENT VERSCHIEDENE SOORTEN VAN

## ETTER ZIEKTEN,

BENEVENS EENIGE PROEFNEEMINGEN EN AANMERKINGEN  
OVER DEN ETTER EN  
ANDERE VOGTEN.

*medegedeeld door*

J. W. H E P P E.

*Stads Medicinæ Doctor en Lector te Campen.*

---

Er wordt thans nog van veele Ziektékundigen vastgesteld, dat de Etter uit eene Ontsteking zijnen oorsprong neemt; en dit is ook eene onbetwistbaare waarheid in zulke gevallen, in welke door eene vermeerderde Levenskracht, voornaamlijk uit de bloedvaten, eene *plastische Lijmphe* wordt uitgestort, geschikt tot nieuwe Organisatie. Dan, wanneer wij in andere gevallen eene stoffe ontmoeten, welke met den besten Etter overeenkomt, zonder echter, bij haar ontstaan, blijken van eene vermeerderde Levenskracht gewaar te worden, maar veel-êr het tegendeel, d. i. eene verminderde Le-

A

vens-



venskracht; dan worden wij verlegen, op welke ziektekundige gronden deze stoffe en derzelver wording te verklaren. — Hebben hier de zogenaamde verborgene of sleepende Ontsteekingen plaats gehad? — En welke zekere Kentekenen hebben wij van den waaren en van den onwaaren Etter?

Deze Vragen zijn zeer moeilijk volkomen te beantwoorden; want, wie is in staat de verborgene en sleepende Ontsteekingen altijd te ontdekken, in gevallen, waar veelmeer eene verminderde dan vermeerderde Levenskracht wordt waargenomen? En neemen wij de Pathologische Anatomie te raade, hoe weinig lichts vinden wij daar, omtrent die Etterverzamelingen, bij welke geene blijken van Ontsteeking zijn voorafgegaan. Men schrijft zulke Etterverzamelingen niet zelden aan verplaatzingen toe; doch zulke verplaatzingen worden weder van eenige Ziektekundigen geheel- en- al ontkend, en slechts aan ziekelijke werkingen der Zenuwen en beweegvezelen toegeschreven; ja zelve wordt door sommigen de geheele zogenaamde *humorale Pathologie* verworpen. Wat blijft ons dan hier overig om de waarheid in eene zoo gewichtige zaak te ontdekken? Niets beters zekerlijk, dan onze eigene waarnemingen en oordeel; vooral om zo veel mogelijk, de wegen



gen na te spooren, welke de natuur tot de bereiding der verschillende Etterstoffe in staat.

Dezen weg heb ik getracht te volgen, en bij het onderzoek van dit Vraagstuk eenige Waarneemingen opgegeven, welke de verschillende theorien aangaande de Etterwording schijnen onzeker te maaken.

Men vindt dan in de eerste plaats een groot onderscheid, tusfchen den *herstellenden* (of *vormenden plastifchen*) Etter, en tusfchen den *verterenden Etter*.

De eerste is zeker een voortbrengfel der vermeerderde Levenskracht, en dus ook eenemet Levenskracht voorziene stoffe, bekwaam tot eene nieuwe Organisatie, welke eigenschap door den Hoogleeraar BLUMENBACH *nifus formativus* genoemd wordt. De tweede is geheel het tegengestelde, eene met Levenskracht weinig voorziene, of geheel daarvan beroofde stoffe, bij welke de chemifche ontbinding reeds begonnen, of de overhand gekregen heeft. Deze kan dus zeer gemodificeert zijn ten opzichte der nog min of meer tegenwoordig zijnde levenskracht, of van eene reeds ver gevorderde chemifche verandering.

Dus ziet men, hoe onvoldoende de uitkomst der Proefneemingen zijn moeten, wan-



neer men de alleen beste of herstellende Etter ter onderzoek genomen heeft. De beste Etter immers, uit zijne nog levende Organa genomen, is buiten dezelve eene levenloze stof, ondergaande dezelfde chemische Ontbinding, als het *Serum* en de *Lympha*: zodat 'er nog altoos zwarigheden overblijven, om de eigenschappen van een waaren Etter door chemische proeven onderzocht, voor algemeen afdoende, aan te nemen.

Offchoon ik zelf dan ook, door Proefneemingen eenige meerdere zekerheid heb getracht te verkrijgen, maak ik echter geene zwarigheid, mijne verlegenheid ronduit te bekenen, om uit die proeven genoegzaam zekere besluiten op te maaken. Men gelieve derhalven mijne Waarneemingen en Proeven slechts als poogingen aan te merken ter oplossing der mij voorgekomene onzekerheden, en men verwagte geenzins eene volkomene verklaring omtrent alle Vraagstukken. Het zal mij ook genoeg zijn, indien kundige mannen hierdoor mogten worden opgewekt, om de geheimen dezer gewichtige zaak verder na te spooren, en onze konst door hunne Waarneemingen te zuiveren van heerschende vooroordeelen, omtrent de aanwending eener bestendige anti-phlo-



phlogistische Geneeswijze, in die gevallen, waar indedaad de onderdrukte Natuur ondersteuning nodig heeft, en dus geene bloedontlastingen, sterke buikzuiveringen, noch schraale leefregel te pas komen; — zoo ook bij die Ettergezwellen waar vroegtijdige opening het beste middel is, en waar de weekmaakende pappen en pleisters de reeds ontaarte stoffe al meer en meer zouden bederven en eene waare rotting bevorderen.

Indien dit gebeuren mogt, zoude ik mij gelukkig achten van toch iets goeds door de mededeeling mijner Waarneemingen en Proeven voor het lijdend menschdom verrigt te hebben; en indien het Genootschap aan dezelve eenige waarde mogt hegten, zoude ik daardoor aangemoedigd worden, om in 't vervolg ook zulke Waarneemingen mededeelen, welke het nut van door konstgewrochte ontsteeking zouden kunnen bewijzen.





## EERSTE AFDEELING,

---

WAARNEEMINGEN.

---

*Eerste Waarneeming.*

Eene Juffrouw oud 40 jaaren, welke zeer zwaar aan samenvloeiende pokjes gelegen had, en welker lichaam bijna geheel met eene zwarte korst was bedekt, in welke hier en daar reeds versterking ontstond, herstelde na een ruim gebruik van Kina, Mijsrhe, Campher en Wijn, zo in- als uitwendig toegediend. Na dat de meeste korsten waren afgevallen, de krachten zich merkelyk hadden hersteld, en eenige reizen ook mercuriaale laxeer-middelen waren aangewend, kreeg de Lijderes in de liesch eene meer of min pijnlijke zwelling. De koorts was zeer gering; de stoelgang natuurlijk; de pis zeer troebel, gevende een dik geelwit zetsel. Langzaam vermeerderde deze zwelling met eene doffe pijn, welke zich allengs langs de binnenzijde der Dije tot omtrent de Knie uitstrekke, het gezwel bleef matig week en natuur-



tuurlijk warm, en op den tienden dag verminderde de dikte aan de Liesch. Mostertpappen, waaszemingen van Azijn en water wierden aangewendt; het Gezwel aan de Dije verhefte zich allengs; de golving des Etters was duidelijk te voelen, en het gezwel nu openende, ontlastte er zich bij de 14 oncen matig dunne, geelwitte Etter, welk zeer stinkende gelijk de pok-zweeren was. De wonde los verbonden hebbende, bleef de etterlozing nog eenige dagen aanhouden, wanneer 'er geen stinkende, maar meer en meer heldere iets klevrige stoffe uitliep. De verslapte deelen met een sluitend verband ondersteunt en bevogtigd zijnde met een *Decoct. C. Salic. alb.* en *Spirit. Vini Camphor*, waren de holtens weldra gesloten; vervolgens inwendig nog eenige weken de Kina met Wijn gegeven zijnde, herstelden zich de krachten ras en de Lijderes genoot haare vorige gezondheid.

Willen wij nu hier, vooreerst, de wegen naspeuren, langs welke deze Etter in de Liesch en Dije is gebragt geworden; dan behooren wij te overweegen de meenigte der pokken, in welke een zoo groote hoeveelheid van Etter bereid werd, dat hierdoor de Levenskracht in den eersten tijd zeer sterk en aanhoudend werkende, allengs moest verminde-



ren, zo dat de eigene chemische werking der gistende vogten al meer en meer de overhand krijgende, eindelijk tot eene geheele ontbinding zoude zijn overgegaan, indien de vermoeide natuur niet door de geneesmiddelen ware opgebeurd geworden. Er was dus reeds een groote voorraad van Etter stoffe voorhanden, welke zich niet genoegzaam door de huid konde ontlasten; 'er bleef nog veel van dezelve onder de korsten zitten, welke vervolgens, door de weder in werking gekomene zuigaderen opgenomen, langs de groote watervaten en klieren gevoerd wierd. In deze vaten en klieren opgehouden, werkte ze nu als eene vreemde stoffe, assimileerde de nog gezonde Lympha, en vermeerderde dus de hoeveelheid van Etterstof. Door deze vreemde prikkeling wierden teffens de vaten krampachtig vernauwd, 'er volgden *congestionēs Lymphæ*, zwelling en doffe pijn der aangedaane deelen; dan die deelen reeds zeer verzwakt en eindelijk door de deprimeerende eigenschap van de Etterstof nog verder haare krachten verliezende, wierden meer en meer uitgezet; haare klapvliezen booden geen tegenstand meer; de stoffe hoopte zich bij gevolg op, en zich daar niet verder kunnende uitbreiden, keerde zij eindelijk terug en stortte zich in het Celweefzel uit.

Men



Men ziet dus duidelijk, dat deze pok-etter niet onmiddellijk uit het bloed is afgescheiden geworden: want had dit plaats gehad, welke hevige toevallen zouden hieruit niet gevolgd zijn! — Wij worden somtijds de nadeelige gevolgen van een wederopgenomen vernielenden pok-etter gewaar, welke in zijn dierlijk bederf reeds ver gevorderd, niet slechts de water-vaten en derzelver klieren, maar teffens ook de vastere deelen, als de beenderen enz. vernield; hetwelk ons de ondervinding leert in het volgende geval.

*Tweede Waarneeming.*

Een meisje van 8 jaaren, de pokjes in groote menigte gehad hebbende, kreeg 8 dagen na het afvallen der korsten een Gezwel aan den Elleboog. De pijn was in de eerste 8 dagen zeer gering, maar nam allengs met de Zwelling toe. Allerleije weekmakende middelen hiertegen vergeefs aangewend zijnde, wierd ik eindelijk 'er bij geroepen. Ik vond het Gezwel zeer week, zonder eenige ontsteking, en stelde voor, hetzelfde hoe eerder hoe liever te laten openen; dan de Wondarts maakte hiertegen veele zwaarigheden; verklaarde dat de stoffe nog niet rijp genoeg



was, en ging voort met het gebruik van weekmakende pappen. Dan, in plaats van zich meer te verheffen, slook het gezwel; allengs zakte de etter naar het handgewricht, welke zwelling door den Wondarts voor eene zugtige opzetting wierd gehouden, die men geenszins mogt openen. De pijn werd allengs knagender en heviger, zo ook de koorts. Nu wierd ik weder bij dit Lijdertje geroepen, om slechts de koorts te stuiten. Ik toonde thans het gevaar waarin het kind zich bevond, zo wel ten opzichte der sleepende koorts, als ook wegens het beenbederf, en andere, van den meer en meer vernielende etter te vreezene gevolgen; men ging eindelijk tot de opening over. De etter was dun, bruinrood en zeer stinkend. Ik vond daaronder veele geelwitte korreltjes, en het beenbederf aan de *Ulna* en *Radius* reeds vrij sterk; de *Carpus* was 'er nog vrij van. De ontbloote beenderen werden met fijn plukzel met *Pulv. Myrrh.* en *Camphor.* bedekt, en boven dit eene stoving gelegd van het *Decoct C. Salic. alb.* met *Spir. Vini Camphor:* daarbij inwendig de *Cort. Peruv.* aangewend hebbende, wierd het beenbederf in den tijd van 3 weken gestuit; 'er volgde een zuivere en goede etter, waarna zich allengs de wonde sloot, en de zieke herstelde vervolgens volkomen.

Hier



Hier zagen wij den opgenomen Etter al zeer verre in zijn bederf gevorderd, zo dat hij niet alleen de Lymphatische vaten, maar de vastere deelen bereids had aangetast, en hij zoude vervolgens zijne vernielende eigenschap ongetwijfeld aan het geheele lichaam hebben medegedeeld, indien hij niet nog bijtijds ware ontlast en de verdoofde Levenskracht in het deel weder opgewekt geworden. Welke middelen zouden toch anders vermogend geweest zijn om de verteerende of vernielende kracht des Etters tegen te gaan? Trouwens de Kina of Kwikmiddelen zouden het alleenlijk niet vermogt hebben, want eerst na de ontlasting dezer stoffe waren deeze middelen in staat hunne goede werking te doen.

Ook na de Mazelen ontstaan somtijds Ettergezwollen, welke weder een geheel anderen Etter, dan die welke zich bij ontfteeking vormt, opleveren. Ik zal hier ook eenige Waarneemingen van deeze soort mededeelen.

### *Derde Waarneeming.*

Een gezond Meisje van 8 jaaren kreeg de Mazelen, welke op den gewoonen tijd uitgekomen, maar waarschijnlijk te veel antiphlogistisch behandeld geworden zijnde, schielijk weder



der verdweenen : koorts, verstijving en pijn in de leden, slaaperigheid en eindelijk benauwdheid op de borst ontstonden reeds in de eerste dagen. Haar Geneesheer wende hiertegen zagte buikzuiverende en andere verdunnende middelen aan. Er volgde nu en dan een sterke buikloop; de koorts nam allengs toe en het Lijdertje teerde uit: Eindelijk na 8. of 10 weken bespeurde men eene dikte, boven den voorsten rand van het Heupbeen tot aan de Liesch, deze was matig gespannen en weinig pijnlijk bij het aanraaken. De beweging van het been wierd van dag tot dag moeilijker. Hiertegen wierd nu eene wasfching van geestrijke middelen aangewend; doch de zwelling nam meer en meer toe en strekte zich langs de Liesch tot het geheele dijebeen uit. Geen nut van de wasfchingen en wrijvingen bespeurende, en de Geneesheer het geval voor eene zugtige zwelling en verlamming verklaarende, begeerden de Ouders van dit Lijdertje mijnen raad. De golvende Etter en de uitwijking van het Dijebeenshoofd ten duidlijkste aange-toond hebbende, stemde haar Geneesheer eindelijk mede tot de opening van het Gezwel. Er volgde een menigte dunne, melkachtige, vunzig, als oude Honig stinkende stoffe, met veele kaasagtige en vliesige stukjes vermengd.

Door



Door de stoffe een vrijen uitgang bij een los verband te laten, was de Dije en Liesch reeds den anderen dag veel geslonken, maar het Dijegewricht en de Heup nog opgezet. Ik liet deze verslapte deelen met koude omslagen van *Cort. Querci* met *Spir. Sal. ammon. & Spir. Vini Camphor.* behandelen. Uit de wond zijperde nog eenen geruimen tijd een dun melkagtig vogt. Vergeefsich verwachtte ik de geheele ontlasting der stoffe uit de gewrichtsholte, en maakte derhalven eene nieuwe opening kort onder den *Trochanter major*, waaruit zich nog veele dunne, melkagtige en zeer kleverige Etter ontlastte. De beenderen scheenen nog gezond te zijn, maar de banden waren zodanig verslapt, dat het dijehoofd meer dan een duim uit deszelfs holte geweeken was. Om nu hier de verslapte deelen weder zo veel mogelijk te versterken, spoot ik 'er daaglijks 3 maal een *Decoct. fol. Sabinæ, Cort. Salic. alb.* en *Tinct. Myrrhæ* in, en hield met de koude stovingen, gepaard met een gepast verband aan; liet inwendig de Kina met Melk gebruiken en een versterkend diët houden. De wond sloot zich allengs, doch mijn oogmerk bereikte ik slechts gedeeltelijk, wordende de banden en spieren wel sterker, maar onmogelijk was het dijehoofd weder  
in



in zijnen natuurlijke plaats te brengen. Vermoedlijk was de Gewrichtsholte reeds te veel misvormd en dus de volkomene herstelling onuitvoerlijk. De krachten namen voor het overige sterk toe, zo dat de Lijderes naderhand door behulp van een stok konde gaan, genieten de voor het overige nog verscheidene jaaren eene volmaakte gezondheid.

*Vierde Waarneeming.*

Een tenger, doch gezond Meisje van 10 jaaren, kreeg de Mazelen, welke den derden dag na derzelver uitbotting weder verdweenen zijnde, door hevige koorts en belemmerde ademhaaling gevolgd wierden. Veele middelen ter weder uitdrijving vergeefs aangewend zijnde, volgde eene sterke buikloop, die eenige dagen aanhield, waarna de krachten verminderden, en de Koorts en benauwdheid voortduurden. In dezen staat, in welken zij reeds 3 weeken lang geweest was, vond ik haar bij mijn eerste bezoek, zeer uitgeteerd, de ademhaaling piepende en zeer moeilijk, zo dat men ieder oogenblik verstikking vreesde. Onder het ademen ontdekte ik aan de Strot een Gezwel, 't welk bij het inademen tot de



de groote van een hoenderei opzwol en weder verdween bij de uitademing. Een ander langwerpig gezwel, het welk twee duimen lang was bevond zich omtrent het midden van het rechter sleutelbeen. Onder den arm waren de klieren zeer opgezet, en langs de binnenzijde van den Arm boven den Elleboog, en het Handgewrigt wierd men nog verscheidene kleine Gezwelletjes gewaar, welke week bij het aanraken, door zagt en aanhoudend drukken en wrijven, plat wierden, maar zich ras weder verheften. Ik opende het groote Gezwel aan de Strot, er liep bijna 3 Oncen dunne iets geleyagtige, bleekgeele en vunzig stinkende etter uit, die zich golfwijze bij het hoesten en ademhaalen ontlastte. Dadelijk was 'er verligting op de borst, kunnende mijne Lijderes nu ruimer ademhaalen en spreken. De wond slechts los bedekt hebbende, bleef de etterlozing voortduuren, en na eenige uren vond ik de Lijderes merklijk opgeruimd, en nog veel Etter opgevende. Het Gezwel boven aan het sleutelbeen was bijna verdweenen, doch hetzelfde drukkende, ontlastte zich ook nog Etter uit deze wond. Vervolgens de overige Gezwelletjes, welke vlak onder de huid zaten, geopend hebbende, was de Etter in deze, gelijk aan die der overige. Ik liet slechts koude sfovingen van het *Decoct Cort.*

Sa-



*Salic. alb.* aanwenden, als ook inwendig het zelve *Decoct* met *Lich. island.* met melk en suiker geven. Na eenige dagen waren de kleine Gezwelletjes geheel verdweenen en geneezen; uit de grootere sijperde nog eenig helder geelwit vogt, 't welk na eenige dagen ook op-hield terwijl de wonden zich slooten. De krachten herstelden zich schielijk, en mijne Lijderes genoot vervolgens eene gewenschte gezondheid.

#### *Vijfde Waarneeming.*

Een jongen van 12 jaaren, bij welken de Mazelen den derden dag weder verdweenen, door zich aan de koude lucht en regen te hebben blootgesteld; kreeg 's avonds een hevige koorts met vliegende pijnen in zijne leden; den volgenden dag bepaalde zich de pijn in de rechter zijde der borst. De pols zeer sterk en snel vinnende, was eene ruime aderlaating aanstonds nodig. Het bloed was na een uur overdekt met een dunne geel-witte korst. — Op de pijnlijke plaats werd eene warme stoving gelegd; vervolgens inwendig eene Emulsie met Salpeter gegeven zijnde, bedaarde den volgenden dag de pijn; 'er volgde in den morgenstond een sterk zweet met troebele pis, en gemak-  
lij-



lijk ophoesten van taaije slijm. Op de borst en hals kwamen de Mazelen weder eenigzins ten voorschijn; de koorts was minder, en den lijder genoot eenige uren een geruste slaap. Tegen den avond verhefte zich de koorts weder, verzeld met vliegende pijnen in zijn rechter schouder en arm. Een damp bad van water en scherpe mostert wierd gebezigd, waarna de pijnen eenigzins bedaarden: des nagts, was hij zeer onrustig; en den daarop volgenden morgen was het schoudergewricht zeer gezwollen met weinig ontsteeking; de pols snel, maar zwak en tuschenpoozend; de ademhaaling moeilijk en zeer reutelend, en door hoesten gaf hij gedurig groote stukken taaije zuivere slijm op. Het *Docoët Hord*: met *Oxym. Simpl.* en *Nitrum* wierd rijkelijk gebruikt. De Zwelling nam hand over hand toe, voornamelijk in de Oxelklieren, waarop ik mostert pappen liet leggen. Den volgenden dag was de golfing des etters duidelijk te voelen, en ik stelde dus voor dit Gezwel ten eersten te laten openen. Dan de Wondarts weigerde de opening te doen, voorgevende dat de etter nog niet rijp genoeg was, en dezelve eerst met weekmaakende pappen tot rijpheid moest gebragt worden. De Lijder en deszelfs ouders ook tegen het openen zijnde, wierd dit



uitgesteld. Den volgenden dag was de Zwelling zeer verminderd, maar de stoffe gezakt naar den elleboog, welke zich daar als een zak vertoonde; en schoon de golving des etters maar alte voel en zichtbaar was, wierd dit Gezwel evenwel van den Wondarts al weder eene Zugt genoemd, en met verteerende middelen — volgens zijne taal — behandeld. Nu begon ook de hand sterk te zwellen; benauwdheid op de borst met een snelle, kleine en tusfchenpozende pols fcheenen ieder oogenblik den dood te dreigen. Thans wilde men mijnen raad opvolgen en alles aan mij overlaten. Ik opende terftond het gezwel aan den elleboog, waaruit zich bij de 8. Oncen dunne geele etter met kaasachtige brokjes vermengd, in een tijd van 3 uren ontlastte. De benauwdheid op de borst verminderde reeds den volgenden nacht, de Lijder fliep eenige uren gerusten ontwaakte merkelyk verligt; ik vond de pols voller zonder tusfchenpozingen, en de ademhaaling gemaklyk. Uit de wonde was nog veele stoffe uitgesijpert, en door zagt drukken volgden nog veele kaazige brokjes en geele dunne etter. De Zwelling onder de huid nu merkelyk minder en de etterzak geheel ontledigd zijnde, liet ik koude stovingen van het *Decoët. Salic. Alb.* met *Spir. Vini Camphor* en *Sal.*



*Sal. Ammoniac.* aanwenden, en den arm met een sluitend verband omvatten; de holtens slooten zich daar op schie-lijk, en de Lijder herstelde zonder eenig ongemak over te houden. — Inwendig nog eenige weken de *Cort. Peruv.* met *Lich. Island* en de melk gebezigd hebbende, herstelden zich ook de krachten volkomen.

### Aanmerking.

Hier hebben wij dan drie verschillende gevallen van Ettergezwellen na de Mazelen waargenomen. Wij zullen trachten derzelve ontstaan en aart eenigzins na te speuren.

Wij zagen dezelve uit eene soort van onvolkomene crisis voortkomen; zijnde eerst ontstaan, na dat de Mazelen waren ingeslagen. Welke is nu de bijzondere aart dezer stoffe? — Waar bleef zij? — Veranderde zij in etter?

Wij zijn 'er indedaad nog verre af den waaren aart der Mazelst offe, even zo min als die der andere smetstoffen, genoegzaam te kunnen bepalen. Al wat men ons hiervan zegt, zijn slechts gissingen. Want, overweegen wij de uitwerking van deze Mazelst offe, zo vinden wij dezelve meestal van eenen zeer scherpen aart; immers alle ver-



fchijnfelen der Mazelziekte dragen blijken van eene fcherpe en prikkelende ftof. Het Mazelfmet van buiten aangebragt, en door de abforbeerende vaatjes op genomen, voornaamlijk op de luchtpijp, neus en oogen haare werking uitoeffenende, en vervolgens zich over het geheele lichaam verspreidende, veroorzaakt fomtijds de kwaad-aardigfte verzweringen zoo in den mond en neus als andere deelen, welke genoegzaam de bijtende eigenfchap der Mazelftofse aantetoonen. Men kan dus de gevolgen opmaken welke ontftaan moeten, wanneer deeze ftofse, 't zij door eene geftoorde, of onvolkomen crisis terug gehouden, gedeeltelijk van de opzuigende vaatjes weder worde opgenomen, en met gezonde vogten vermengd, waar door deze mede fcherp moeten worden, en alle toevallen vermeederen; want, welke ook den aart deze fcherpte zijn moge, zij werkt al een vreemde prikkel, verwekt dus krampachtige famentrekking der opflurpende vaten en klieren, en dus ophooping en inftuitingen der Lympha zelve. Deze vaten en klieren eindelijk haare kracht verliezende, blijft de ftofse in dezelve opgeflooten en 'er volgen Symptomatifche kliergezwellen of terugwijking en uitftorting in het

Cel-



Celleweefzel, welk onder den naam der Lymphatische gezwellen voorkomen. De levenskracht dezer deelen verminderd zijnde, moeten gevolgelijk de vogten al meer en meer ont-aarten, scherper worden en eindelijk de vaste deelen aantasten. Maar zulk eene ontaarte stoffe kunnen wij nooit voor een waare Etter houden, dewijl 'er alle eigenschappen van eene Plastische Lympha aan ontbreekt. — Zeer langzaam ondertusfchen gaat deze stoffe tot verrotting over, en behoud haare eigenaartige vunzige, honigagtige lucht een langen tijd. Met het *Oleum Tart. p. d.* en warm water vermengd en geroerd, wordt ze een weinig taai. Zij verandert het met Lakmoes ge-verwd papier eenigzins rood.

Indien nu deze ontaarte Lympha in de bloedvaten wordt opgenomen, dan werkt ze ook hier, als een vreemde prikkel, 'er worden dus ligtelijk ontsteekingen voortgèbragt, gelijk wij in de vijfde Waarneeming gezien hebben. Dan, hier kan deze stoffe niet lange vertoeven, de tegenwerking is te sterk, en dus wordt zij weldra langs alle de afscheidingswegen weder uit het bloed gedreven. Geschied dit nu langs de gewoone ontlastwegen, dan volgt ook ras de geneezing. Maar in de holten uitgestort en uit deze weder opgenomen en verder in de ont-



lastwegen gebragt wordende, verwektze ook hier nieuwe tegennatuurlijke prikkelingen, en dus vermeederde of verminderde afscheidingen. Was nu deze Etter reeds bereidt in het bloed en wierd zij door de Klieren vervolgens afgescheiden? Dit is niet waarschijnlijk, maar wel, dat de verplaatzing van deze stof in dit deel te vooren reeds geschied was, en dat door de sterkere prikkeling der watervaten en klieren, geholpen door de uitwendige Middelen, de werking der Ziektestof op de borst verminderd wierd. Immers volgde 'er schielijk eene critische afscheiding door het zweet, de Urin en het ophoesten van slijm, bijgevolg kan deze stoffe geenzins alleen als een voortbrengfel der ontsteeking gehouden worden, maar voor een gemodificeerde Etter van de reeds te vooren ontaarte *Lympha*, en nu eerst meer gemodificeerd door de bijgekomen ontsteeking. Ook blijkt het uit haare eigenschappen, dat dezelve zeer onderscheiden is van den door eene waare ontsteeking voortgebragten Etter.

Herinneren wij ons de menigvuldige wijzigingen van den Etter, in gevallen, waar de gelegenheid gevende oorzaaken van buiten afkomstig zijn, welke als een vreemde prikkel niet slechts het gestel der watervaten, maar teffens die van het bloed tegennatuurlijk prik-  
ke-

kelen, en dus ontfteekingen voortbrengen, terwijl doch de levenskracht niet lange kan tegenwerken, maar weldra bezwijken moet: daar ontmoeten wij ook geen waaren Etter, maar hij is zeer verschillende gemodificeerd, naar gelange de Levenskracht minder of meerder werkzaam is. Ik zal dan ook nog eenige Waarneemingen hier plaatzen, om te doen zien de verscheidenheid der ziekten in het voortbrengen van bijzondere foorten van Etter.

*Zesde Waarneeming.*

Een sterke Boer van 24 jaaren, den gantschen dag in de brandende Zonnesc in zijn gearbeid, en tegen den avond eenige uren lang, bij een opgekomen zwaar onweder, onder een sterke regen en in stinkend water, waar hij zijn Vlas uithaalde, gestaan hebbende, gevoelde reeds den volgenden dag eene stramheid, zwaarte en vliegende pijnen in zijne leden; 's avonds volgde een zwaare koorts met benaauwdheid en spanning omtrent den maag, neiging tot braaken, verzeld met een bittere smaak; de buik van winden opgespannen, met krimpingen zonder stoelgang, nam hij, volgens Boeren gewoonte, een goede gift van Jalappe - wortel met Genever, waar na hij ver-



scheiden ontlastingen en braakingen van geelgroene en dunne stoffe kreeg. Alle Symptomata verergerden en reeds den 3<sup>den</sup> dag daarna werd de Lijder geelzugtig; de ademhaaling zeer moeilijk. In den rechter schouder gevoelde hij een stekende pijn, zich uitsprekkende langs den arm, terwijl de schouder zeer begon te zwellen. Op aanraden eener boerin werd het gezwel met goudglidzalf gesmeerd: de zwelling nam hand over hand toe, en bereikte in den tijd van 5 dagen de grootte van een kinderhoofd, was week en golvende; evenwel hield men aan met smeeren, en na eenige dagen verminderde het gezwel merklijk; dan de benaauwdheid op de borst werd allerhevigst, de koorts aanhoudende en hij hoestte veel geelgroene slijm op. Nu werd ik tot hulp geroepen, en vond den Lijder ten uitersten benaauwd, de ademhaling reutelend, de pols zeer klein, rad en tuschenpoozend; daarbij zijn geheel lighaam saffraangeel, en de pis bloedrood geverwd. Het gezwel aan de schouder was slap en half ontledigd; aan den Elleboog ontdekte men eene andere zwelling, als eene half gevulde blaas; de buik was opgezet, de tong bruingeel beslagen en in 3 dagen was 'er geen stoelgang geweest. Ik opende terstond de zak aan den Elleboog, waaruit bij de 6 oncen geel-

geelgroene , smeerige en als rotte visch stinkende Etter uitliep , welke na eenige minuten iets lilagtig wierd. De wonde los bedekt hebbende , werd de toevloed van stof steeds aanmerkelijker. Klijsteeren van *Infus Flor. Chamomill.* met Azijn en Honing verschaften spoedige ontlasting van zwart-bruine , dunne en zeer stinkende stoffen ; vervolgens inwendig door *Fr. Tamarind* met *Serum Lactis* dezelve nog meer bevorderende , volgde 'er dadelijke verligting. Uit de wonde sijperde nog bij aanhoudenheid een geelgroene dunne Etter. Het Gezwel aan de schouder verminderde wel ras , en hetzelfde en den geheelen arm met koude stovingen van het *Decoct. Cort. Salic. alb.* en *Spirit. vin. Camphorat.* bedekt hebbende , slooten zich de holten , ook wierd de stoffe van dag tot dag helderer , en na 6 dagen deze sijpering geheel ophoudende , was de Lijder door behulp der inwendige middelen als eerst van *Decoct. Gramin.* met *Oxym. Simpl.* en *Crem. Tart.* en vervolgens door de *Cort. Peruv.* met *Rheum.* in een korten tijd volkomen genezen.

#### Aanmerkingen.

Ook hier zagen wij dan een schielijke vorming van een Gezwel , verplaatzing der Ziektestoffe



en het ontstaan van een bijzonderen Etter. Wij willen deszelfs vorming en aart wat nader overwegen.

Indien men hier op de gelegenheid gevende oorzaaken acht geeft, dan ziet men, dat door den arbeid in de heete Zonneschijn, sterk zweeten, vervolgens verkoeling door den regen en stil staan in bedorven water en lucht, gelijk bij de Vlasruide gebeurd, niet alleen de uitwaasfeming der huid terug gedreven, maar teffens de grootste gelegenheid gegeven wierd, tot eene vermeerderde opslurping van eene menigte rottende deeltjes, welke ten deele door de inademing onmiddelijk door de Longvaatjes in 't bloed gebragt, de hevigste uitwerkingen moesten voortbrengen, het welk blijkbaar was door de sterke koorts enz.; en verder, dat ook vooraf de opslurpende werking der huid door de hitte en arbeid vermeerderd was, en dat dus de vaten der huid van die schadelijke stoffe zoo veel meer overladen moesten worden. Ook zagen wij weldra hevige pijnen en krampen ontstaan, welke het gevolg van sterke prikkeling deezer deelen waren. De levenskracht op deze wijze aangedaan, tragtte met alle kracht tegen te werken, doch de afscheidingen op alle wijze vermeer-

meerderd zijnde, moest ook de Gal afscheiding toeneemen en de Gal zelve mede ontaart worden; en daar deeze weder van de inzui-gende vaten opgenomen wierd, de Geelzugt ontstaan. De natuur derhalve gedurig nieuwe toevloed van ontaarte vogten verkrijgende, zoude eindelijk bezweken zijn, indien zij niet in tijds ware bijgestaan door het ontlasten der afgescheidene stoffe, zo door door den stoelgang als door de opening van den Etterzak.

Wij vonden de daarin bevatte stoffe zeer stinkende, als rotte visch. Een bewijs, dat het bederf reeds zijn vrije gang ging, dewijl de Levenskracht niet meer vermoogend was hetzelfde tegen te gaan. Hier waren de watervaten en derzelve klieren opgevuld en uitgezet door de ontaarte *Lympha*, en daar zij haare kracht verlooren hadden, keerde de stof terug, stortte zich uit in het Celweefzel, en veroorzaakte de zwelling. — Deeze stoffe was dan ook geen voortbrengsel van eene voorafgegaane ontsteeking, noch afkomstig onmiddelijk uit het bloed; maar zij was in de opslurpende vaten zelve dus veranderd en ontaart.

Bij deeze gelegenheid herinner ik mij nog eenige gevallen van gezwollen bij galachtige

*Rheu-*



*Rheumatismi*, waar ik de stoffe groengeel en zeer liagtig bevonden heb, als ook van eenen bijzonderen stank dier stoffe, niettegenstaande de tegenwerking der Natuur sterk genoeg was, om de waare *Lympha* tot Etter te bereiden. Hoe wierdt nu deeze stoffe zoo stinkend? Heeft het Phosphorzuur hier de overhand? Ik neem niet op mij om dit te verklaren, maar zal slechts aanmerken dat bij Proeven met deeze stoffe genomen, na dat zij eenige dagen gestaan had, eene sterke Phosphorzuure lucht ontstond, en het Lakmoespapier eenigzins rood geverwd wierd. De Chemische Reagentien welke moeten dienen om dit nader te onderzoeken, waren mij toenmaals nog onbekend, en zedert heb ik hier geene gelegenheid gevonden van zodanigen Etter op deze wijze te kunnen onderzoeken.

Ik vind onder mijne Waarneemingen nog een bijzonder geval van een Ettergezwel bij eenen jichtigen Lijder, het welk na eene voorafgegaane beroerte en verlamming ontstond, en welkers oorzaak en aart derhalven mijns bedunkens opmerking verdiend.

#### *Zevende Waarneeming.*

Een doof en stom, doch voor het overige gezond

zond man, van 68 jaaren, kort en dik van lighaamsgestalte, gewoon aan sterke voedfels, bij weinige beweeging, sedert verscheiden jaaren aan de jicht en zugtige beenen onderhevig, wierd in de maand October 1780. na eenige weeken te vooren met de Heupjigt geplaagt geweest te zijn, 'savonds in de guure en natte lucht eenigen tijd zich opgehouden hebbende, door eene beroerte overvallen, waarna de geheele rechterzijde verlamd werd. Na aanwending van eene maa-tige aderlaating, scherpe Klijsteeren en Vesicatorien op den rug, armen en beenen, herstelde zich het gevoel en de beweeging in zijn rechter arm, maar zijn rechter been bleef gevoelloos en verlamd. Des Lijders lighaamsgestel, leefwijze en voorige ongemakken duiden genoeg den overvloed, taaiheid, en scherpheid zijner *Lympha* aan, begunstigd door de Atonie der vaste deelen, dog wel voornaamlijk van de watervaten.

Na genoegzaame zuivering der eerste wegen, nam ik mijn toevlugt tot prikkelende middelen, bestaande uit *G. Guajac. Aethiops Antimon.* met *Extr. Aconiti* en *Decoct. Lign. Sasfr. Guajac. herb. Chamæpit. &c.* — Eenige dagen daarna zeide mij de Lijder, dat hij krimpelingen in zijn buik gevoelde, walging be-  
sta-



slagen tong en bittere oprispingen had. - Een drankje van *Tart. Tartaris.* ʒʒ *Tart. emet.* gr. ij *Oxym. Simpl.* ʒij. en *Aq Fl Chamomill.* ʒvj. , veroorzaakte door braking eene ontlasting van veel groengeele taaije slijm, en door stoelgang veele zwartbruine en zeer stinkende stoffe en taaije slijm. Na deeze ontlastingen werd de eetlust en stoelgang weder natuurlijk. De verlamde deelen en ruggegraad werden met *Spirit. Rorismarin. Spirit. Salis ammon. c. C.* en *Tinct. Cantharid.* gewreven, het gevoel en de beweging herstelden zich in den arm, maar het been bleef hetzelfde; ik beproefde na het wrijven de Electriciteit niet slechts door het trekken van vonken langs den ruggegraad en het been, maar ook met nu en dan kleine schokken tóetebrengen. Na omtrent vier weken hiermede voortgevaaren te hebben, kreeg mijn lijder eensklaps zijne oude Heupjigt weder; hij wilde nu geen wrijven noch electrifieren meer ondergaan, en was zeer moedeloos, doch hem beduidende, dat dit een goed teken was en ons hoop gaf tot herstelling, liet hij toe op de pijnlijke plaats en langs het *Os Sacrum* een *Empl. Vesicat. perpet.* te leggen; dan de pijn nam al meer en meer toe, en de pleister ses dagen gelegen hebbende, moest eindelijk afgenomen worden; de

de pijn bleef aanhouden en strekte zich tot aan de knie uit. Onder de knie ontdekte ik vervolgens een langwerpig gezwel, 't welk den Lijder bij het aanraken veel pijn veroorzaakte. Ik bedekte het zelve met een pleister van gelijke deelen *Empl. de Galban* en *Vesicator*. Deze pleister tien dagen lang 'er op gelegen hebbende, vond ik het gezwel iets weeker, dog te gelijk pijnelijk. Hem aanradende om hetzelve te openen, drong hij 'er zelf op aan in hoop van daar door genezen te worden. Bij de opening was ik verwonderd, dat ik bij het doorsnijden zoo veel moeite moest aanwenden wegen de taaheid der deelen, terwijl ik zag dat het gezwel uit louter Celletjes bestond, welke met eene taaie, geele en onlijdelijk stinkende etter op gevuld waren, die zich met geen spons liet afvaagen noch met de vingers uitdrukken. Echter scheen de Lijder onder dit alles weinig pijn te gevoelen. De wonde eenige dagen met een *Unguent. digestiv.* verbonden zijnde, gaf weinig etter. Ik stak nu stukjes spons in dezelve, doortrokken met het *Decoct. C. Salic. alb.* en met eenige druppelen *Spirit. Sal. Ammon.*, en liet den spons hiermede dikwijls bevogtigen. Ook daar van scheen de



de Lijder weinig gevoel te hebben; na eenige dagen wierd de etter iets vloeibaarer, scheidde zich ook in grooter hoeveelheid af, en na zeven dagen volgde eene goede ettering met verdeeling der Celletjes. Het gevoel wierd thans sterker; ik verminderde dus den *Spir. Sal. Ammon*; en nog vijf dagen daarmede aangehouden hebbende, was de wonde in een goede staat gebragt; de herstellende etter verscheen, en de geneezing volgde in korten tijd. — Van dag tot dag zag ik nu het gevoelen de beweging in het been, toenemen en de Lijder begon weder met behulp van een stok te gaan. De verlamde deelen nog eenige weeken gewreven hebbende met *Spir. Sal. Ammon.* en *Sp. Rosmarin.* herstelde de beweging volkomen, en de Lijder leefde nog 10 jaaren daarna, zonder eenig ander ongemak, dan zijn gewoone jigt.

*Aanmerking.*

Wij zien dan in deeze Waarneeming dat na de verplaatfing der jigtstoffe de Beroerte is gevolgd. De wijze van deeze verplaatzing laat zich zeker niet gemaklijk verklaren; wij zullen slechts de mogelijkheid derzelve nasporen.

Raadpleegen wij hierover de *Pathologische Anatomo-*

*Anatomie* over den aart der Jigtstoffe, dan leert ons deze, dat 'er een taai vogt van eene eigenaartige scherpte, bij zodanige Lijders gevonden wordt, omtrent de gewrichten, het welk somtijds zodanig ontaart is, dat het de hardheid van kalkaarde verkregen heeft. En scheikundige proeven leeren ons, dat dezelve slijmerige stoffe met phosphor-zuur overladen is, waardoor dit vogt stremt en kalkachtig wordt.

Hoe kan nu een zodanig taai vogt zich naar de Harsfenen verplaatzen? — Overweegen wij de sterke inzuigende kracht der absorbeerende Vaatjes, waardoor zelfs de hardste deelen van ons lighaam weder opgenomen kunnen worden, dan wordt het ook waarschijnlijk, dat hier eene opslorping en verplaatzing mogelijk geweest zij.

Om het ontstaan der Beroerte te verklaren behoeft men de onmiddellijke verplaatzing der ziektestoffe naar de Harsfenen niet aan te nemen. Een gedeelte der Jigtstoffe was doch reeds in staat, door derzelver prikkeling op de watervaten, dezelve tot krampachtige bewegingen optewekken, en deze medegedeeld aan andere deelen, konden ligtelijk *congestiones* zoo wel der *Lympha* als van het *Bloed* doen ontstaan, waardoor dan ook drukking op de



Zenuwen en Harsfenen, uitstorting der vogten in derzelver holliheden, en vervolgens eene Beroerte veroorzaakt moest worden. Wij vinden immers foortgelijke voorbeelden opgetekend, waar de *Vagina Nervorum* en de *Cellulosa* met een taaije stoffe opgevuld zijnde, en waardoor dus de Zenuwen gedrukt wierden, eene verlamming volgde. Wij zien zulks onder anderen bij *Isenflamm. Pract. Wahrn. über die Nerven* §. 27. 29.

Ook bij onzen Lijder wierden zodanige krampachtige drukkingen waargenomen, welke ophoudende, de vogten haaren vrijen loop weder gaven, en dus de afscheiding bevorderden, waardoor de belette werking der Zenuwen zich gedeeltelijk herstelde; doch niet volkomen, vermits deze deelen, te vooren reeds te veel aangedaan zijnde, geene genoegzaame tegenwerking op de zich nog daar ophoudende stoffe konde uitoeffenen, zo lange niet den invloed der Levenskracht, opgewekt door de prikkelen- de middelen, zoo in- als uitwendig aangewend, hersteld was; daardoor kon deeze stoffe, nu weder geabsorbeerd, allengs naar buiten gebragt worden. Dan een ander gedeelte dezer stof in de klieren en slijmbeursjes onder de knie nog opgesloten zijn-

zijnde, ende opslurping, zo wegen atonie dezer deelen, als onwerkzaamheid der abforbeerende vaatjes niet genoegzaam voortgaande, bleef zich aldaar ophouden, en van den invloed der Levenskracht beroofd zijnde, moest zij eindelijk tot bederf overgaan.

Ook hier werd derhalven geen waaren Etter gevonden. Eerst naderhand zagen wij, na dat de vaste deelen in een staat van ontsteeking gebragt waren, den waaren herstellenden Etter volgen, waarna de afscheiding der bedorven en de herstelling der gezonden deelen voortging.

Meermaalen heb ik bij jichtige Lijders Ettergezwellen en verplaatzingen ontmoet. Ik zal onder anderen eene Waarneeming hier mededeelen, in welke men veele modificatien van Etter en verplaatzingen aantreft, welke ons den weg aanwijzen, die de natuur veeltijds tot haar behoud inslaat.

#### *Agtste Waarneeming.*

Een groot en sterk man van 46. jaaren, van eenen podagreusen Vader afkomstig, verscheidene jaaren aan rheumatieke en jichtige ongemakken onderhevig, overwon (bij het houden van een streng diët) door zijn



gezonden inhoud, steeds deze ongefteldheid zonder behulp der konst. Dan hierop vertrouwende, achtte hij op 't laatst zijne ongemakken zeer weinig, en wierd in het najaar op nieuw fterk met het podagra bezogt, waartegen hij niets dan een aftrekfel van Vlierbloemen gebruikte, en zijne gezwollen voet in roode baai wikkelde. Niet lange duurde het bezoek van dezen onaangenaamen gast, en den Lijder begaf zich wel ras weder aan zijn fchrijf-arbeid, zich daarbij steeds van een warme ftoof bedienende. Na zich eenige tijd wel bevonden te hebben, kreeg hij eensklaps zeer hevige en vliegende pijnen in het been, de rug en nek; eenige uren laater ontftond eene fterke koorts, verzeld met hevige fteekingen in de borst en fchouder; van daar plaatfte zich de ftof naar de keel, welken binnen korten tijd zoodanig aangedaan werd dat hij naauwliks eenig vogt konde doorflikken. Zijne gewoone middelen hier niet toereikend zijnde, wierd ik ter zijner hulp geroepen. Ik vond den pols zeer fnel en hard, de oogen rood en uitpuilende, de ademhaaling moeilijk en piepend, den mond en keel bezet met een taaije glinsterende flijm, daarbij ijelde de Lijder zeer fterk. Na het doen eener ruime aderlaating, het aanwenden van dampbaden, door de mond  
op

op de aangedaane deelen, en het aanleggen eener weekmakende pap aan den hals, alsmede door het gebruik van prikkelende voetbaden, bedaarde de koorts tegen den morgen. Nu deed ik den Lijder mondspoelingen gebruiken van *Infus. Flor. Chamomill. Sambuc. Oxym. Simpl.* en *Sal. Ammoniac*, benevens een *Decoct. Rad. Gramin. Altheæ* met *Oxym. Simpl.* en *Spirit. minder*: teffens wierd door klijsteeren de stoelgang bevorderd. De pis wierd nu zeer troebel, en eene zachte zweeting volgde, waarna de Lijder zich zeer verligt gevoelde, daarbij veel taaije slijm uit de keel ontlastte, welke reeds den 3den dag etterachtig wierd, smaakende zwavelachtig en zeer wrang. Drie dagen duurde deeze etterachtige ontlasting, waarna dezelve allengs verminderde, en in eene ruime uitwerping van natuurlijke slijm en speeksel veranderd wierd, waarop de herstelling spoedig volgde. —

Den gantschen winter door zich wel bevonden hebbende, ontstond in 't voorjaar weder een hevige aanval van jicht in de schouder en nek, verzeld met een zwaare hoest, en opgeving van ziltige taaije slijm, waartegen de Lijder slechts een aftrekzel van Zoethout en Vlierbloemen gebruikte. Hierbij voegden zig nog slijmige



Aambijën, en een zeer lastige Herpetische uitslag aan het Scrotum, die zig vervolgens ook over den nek en het agterhoofd verspreidde; hier en daar ontstonden ook kleine huidzweertjes, en eindelijk een groot Negenooog, welk een zeer slijmigen dikken groenachtigen etter van zich gaf, en verscheiden weeken lang open bleef, eer dezelve een goeden etter uitleverde, waarna in korten tijd de geneezing volgde. Nu bleef de Lijder een tijd lang van zijne Jicht bevrijd; echter kwamen in het najaar de rheumatieke ongemakken wederom te voorschijn, waarbij zich de slijmige Aambijen en slijm graveel voegden; somtijds ook met opspanningen van winden in den bovenbuik, en voornaamlijk in de rechter zijde geplaagt wordende, liet ik hem de *Pulpa Tamarind.* met *Manna. Flor. Sulphur* en *Cryst. Tartari* gebruiken. Na ontlasting van veele zwarte, taaije en zeer stinkende stoffen, schreef ik hem pillen voor uit *Sapo Antimon. G. Guajac. Merc. Dulc.* en *Extr. Millefol.* tot gewoonen drank nam hij een *Decoct.* van *Rad. Gram. Bardan.* en *Lign. Sasfafras* met kalkwater; waarna deze ongemakken allengs verminderden, en de Lijder gedurende een langen tijd volmaakt gezond bleef. Dan, na eene sterke

ke verhitting en gemoeds-aandoeningen, bespeurde hij weder eene volheid, drukking en spanning in de *Præcordia*, met een bitteren en wrangen smaak, rommelingen en krimpelingen in de darmen, traagen stoelgang, vervolgens vliegende pijnen in alle leden, rug en nek, met ongeregelde koortzen vergezeld. Op 't gebruik van een *Decoct. R. Gram. en Taraxac.* met *Oxym. Simpl.* en *Sal. Mir. Glaub.* en eene ailengs vermeerderde gift van *Tartarus Emet.* wierd de ontlasting der stoffen in de eerste wegen naar boven en onderen bevorderd, waarop de koorts in eene geregelde anderen - daagfche veranderd werd. Met deze middelen voortvaarende, bevond zich de Lijder in de tusschen tijd zeer wel; dan met de 6de paroxysmus kreeg hij 's nagts hevige pijn in de heup, liesch en dije. Door aanwending van warme stovingen en dampbaden van water en mostert verminderte de pijn geenzins, doch bepaalde zich meer op ééne plaats van de dije, waaraan echter zwelling noch hitte te bespeuren was. De pijnlijke plaats met een scherpe mostertpap bedekt hebbende, ontstond 'er na 3 dagen een Gezwel, het welk schielijk in groote toenam, en dat tegelijk week en natuurlijk warm bleef; den Etter duidelijk bespeurende, wachtte ik ook niet lang met denzelven een



uittogt te geven , en 'er ontlastte zich een taaije , of liever , smeerige , bleek geele Etter. Twee dagen lang bleef de uitvloeijing van denzelfven aanhouden , waarna allengs een helder en iets lijmerig vogt volgde , en de wonde zich sloot , slechts met een maatig sluitend verband geholpen. De koorts was intusschen zeer gering , en kwam nog eenige maalen op haaren gewoonen tijd.

De Kina met *Flor. Sulphuris* eenige dagen gebruikt hebbende , bleef ook de koorts weg , en de Lijder bevond zich zeer wel. Eenige tijd daarna kreeg hij des nagts aan den anderen voet het podagra in eene heevige graad , doch 't welk niet lange aanhield. De Lijder loosde gedurende zeven dagen veele dikke en zeer stinkende Pis , waarop de geneezing volgde , gebruikende hij nog eenige weeken pillen van *Sap. Antimonial. G. Guajac.* en *Extr. Stip. Dulcamar.* met in achtneeming van eene gepaste leefwijze.

#### *Aanmerking.*

In deze Waarneeming vinden wij dus weder veele modificatien der Jigtstoffe. Wij zagen hier duidelijk na eene onvolmaakte Crisis van het Podagra , de Cijnanche met uitwer-

werping van veel taaije en glinsterende slijm, en daarna die eener etterachtige stoffe, ontstaan. — Was dit nu geene waare verplaatsing der Jigtstoffe? — en langs welke wegen geschiede dezelve? zonder twijffel, is de nog verborgene Jigtstoffe aan de Voet door de opflorpande Aderen opgenomen, en in de Keelklieren gevoerd, waarop het eerst aangedaane deel schiekelijk van deszelfs prikkel bevrijd wierd; doch de stoffe niet rijp genoeg zijnde, om langs de andere wegen naar buiten gevoerd te kunnen worden, wierd dus van de opflorpande vaten weder opgenomen, en ten deele onder het bloed gevoert, waardoor de vaten tegennatuurlijk geprikkeld wordende, aangezet wierden, om er zich langs de afscheidingswegen van te bevrijden; gedeeltelijk zette zij zich in de Keelklieren, en deze niet minder hier door aangedaan, trachteten op allerlei wijzen zig van deze stoffe ten spoedigsten te ontlasten; 'er volgde dus eene menigte taaije en wrange slijm, en eindelijk eene etterachtige stoffe. Heeft hier nu eene Ontsteeking plaats gehad, waardoor dezen etter wierd voortgebracht? Dit is zeer waarschijnlijk, en schoon men in de keel dezelve niet ontdekken konde; zo kan zij evenwel dieper in de Bronchien haare zitplaats gehad hebben, vanwaar dan ook deze



Etter voortgekomen is. Gaan wij verder den loop dezer ziekte na, dan vinden wij teffens blijken genoeg van eene fcherpe en taaije *Lympha*, welke haare vaten en klieren prikkelende, een foort van ontfteeking in dezelve veroorzaakt heeft; dit blijkt immers ook uit den herpetifchen uitflag, uit de lang aanhoudende en gedurig weder komende Negenoo-gen, uit welke geen gezonde, maar flijmige etter ten voorschijn kwam, fchoon zij door eene genoegzame graad van ontfteeking verzeld waren. Toen eerst, wanneer de ontfteeking gemaatigd was geworden, volgde de herftellende etter.

Wij zagen verder na voorafgegaane geregelde aanvallen der koorts eenklaps de hevige pijn in de heup, liesch en dije, egter zonder eenige zwelling noch vermeerderde warmte van deze deelen, gedurende de eerfte dagen ontftaan. Had hier eene verborgene ontfteeking plaats gehad, waar de Levenskracht flegts plaatflijk op de bloedvaten haare tegenwerking bepaalde, waardoor 'er vervolgens eene active ontfteeking, en door deze, weder de Etter is voortgebracht geworden? Eene active ontfteeking, d. i., waar eene algemeene uitoeffening der kragten van het Vaatgeftel plaats heeft, was doch hier niet wel aanteneemen; wij za-  
gen

gen immers geene blijken van dezelve. De tegenwerking der bloedvaten was hier te zwak om eenen waaren herstellende Etter aftefcheiden; 'er wierd dus aanstonds eene ophooping van eene ontaarde *Lympha en Serum* voortgebracht, en aan de watervaten en andere vaste deelen de behoorlijke kracht ontbreekende, moesten dus de vogten, hoe langs hoe meer ontaart worden. Proeven met deze stoffe genomen, toonden ook de onvolmaaktheid van dezen Etter genoegzaam aan. Zij veranderde met het proefmiddel *van Grasmeyer* in een soort van Geleij, die zig gedurende eenige dagen als draaden liet uitrekken. In warm water werd dezelve weinig of niet ontbonden, ook verwde zij het Lakmoes papier eenigfints rood. Na 7. dagen in een gesloten flesje gestaan te hebben, gaf zij eene sterke phosphorachtige lucht van zich; wierd meer ontbonden, en op den bodem vertoonden zich veele witte vlokken.

Bijna in geene ziekte ondervinden wij meer verplaatzingen en veranderingen dan in die, der Jigt. Doch letten wij op andere Slijm-Ziekten, als Catarrhi, Rheumatismi enz. dan vinden wij dezelve niet zelden met pasfive ontsteekingën vergezeld, en daarom ook de ontlaste stoffe meenigmaalen, naar mate der ont-



ontsteeking, min of meer Etterachtig. Ik had gelegenheid dit waarteneemen.

*Negende Waarneeming.*

Een arm, tenger dienst-meisje van 16 jaaren, de maandstonden nog niet gehad hebbende, welke bij een winkelier diende, en zich gedurig in eene vogtige Keuken en Kamer, moest ophouden, kreeg hevige vliegende pijnen in haare leden, met een sterke koorts vergezeld. Reeds den derden dag daarna begonnen de klieren in de Liesch op te zetten; en vervolgens ook de geheele dije, zonder merkelijke hitte of roodheid te zwellen. De bijgeroepen Heelmeester, oordeelde een pleister om de zwelling te verdrijven, noodzakelijk; na drie dagen was dezelve merklijk geslonken, doch tegelijk was eene benauwdheid op de borst met reutelend Ademhaalen en op hoesten van eene geelachtige slijm ontstaan. Nu werd ik er bijgeroepen en vond, bij de opgenoemde toevallen, nog een zeer rasfe kleine tusschenpoozende pols, en het Gezwel aan de dije slap en meer als de helft geslonken. Ik liet terstond eene scherpe Mostert pap op het geheele gezwel leggen, en inwendig een *Infusio flor. Arnic.* en *Sambuc.* met *Oxym. Simpl.*

en

en eenige greinen *Tart. emet.* gebruiken. Den volgende dag was de Etterzak aan de dije reeds weder meer aangevuld, en de ademhaaling iets ruimer, doch tegelijk met ophoesten van veel taaije slijm verzeld. Ik stelde den Wondarts, de noodzakelijkheid om het Gezwel te openen voor; doch deze maakte veele zwaarigheid, wegens de onrijpheid enz. en wilde vooraf weekmaakende pappen aanwenden; doch op mijn aandringen opende hij het den volgende dag; Er ontlasteden zig omtrent 8 oncen groengeele, dunne, iets kleverige Etter, zonder eenigen stank; waarna de toevloed van vogten naar de wond vrijaanmerkelijk werd met dadelijke verlichting van alle toevallen. Ik liet thans de *Kina* in koude aftreksels met *Sal. Ammoniac* in eene ruime hoeveelheid gebruiken. Na eenige dagen veranderde de kleur des Etters in een geelwitte; dog 'er ontlasteden zich nog veele vlies en kaasachtige stoffen. De wonde los bedekt en de dije met een welsluitend verband ondersteund zijnde, en te gelijk gewasfchen wordende met *Spirit. Sal. Ammoniac* en *Sp. vin. Camphor.* wierd de stoffe van dag tot dag helderer, en als zuivere *Lympha* waarna zich in tijd van 8 dagen de wonde sloot en de volkomene geneezing volgde.

*Aan-*



## Aanmerkingen.

Hier zagen wij dus weder het schielijk ontstaan van een Gezwel, eene spoedige verplaatsing der ziektestof, verzeld met haare gewone gevolgen, en een bijzondere soort van Etter.

Letten wij hier op de gelegenheid gevende oorzaken, dan blijkt ten klaarsten, dat door een aanhoudend verblijf in eene vogtige Keuken en Kamer, eene menigte van schadelijke deelen opgenomen, en de vaste deelen verslapt zijn geworden. Voegd men hier nog bij de op dien tijd heerschende Rheumatique en Catarrhale gesteldheid der Lugt, dan vinden wij oorzaken genoeg, om eene ontaarting der *Lympha*, aan te toonen, welke haare vaten tegennatuurlijk prikkelende, krampen en *Congestiones Lymphæ* voortbragt; de vaten daarenboven reeds zeer verslapt zijnde, konden geen langen tegenstand bieden; 'er volgde dus eindelijk terugwijking en uitstortting der ziekte - stof in het Celweefzel; naderhand echter, werd door een nieuwen invloed der Levenskracht, een gedeelte dezer uitgestorte *Lympha* weder opgenomen, welke verder rond gevoerd, hier en daar krampen en pijnen en daaruit weder *Congestiones Lymphæ & Sanguinis* veroorzaakte; doch gedeeltelijk in de bloedstroom terug gebragt

bragt zijnde, volgden wel ras de sterkste tegenwerkingen, waarop dezelve eindelijk langs alle afscheidings - wegen naar buiten gevoerd werd, gelijk wij uit de troebele pis, sterk zweet en het ophoesten van veele Etterachtige stoffen, duidelijk zagen. Daar echter de verdere opneming dezer schadelijke stoffe in het bloed, met kracht tegengehouden wierd, moest zij zich hier en daar opzamelen en eindelijk een uitstorting derzelve in deze reeds verstopte deelen volgen. Door de van buiten aangebrachte prikkeling werd nu de toevloed der nog agtergebleven stoffe naar dit deel terug gelokt, waarop de zwelling der reeds uitgerekte deelen hersteld en de ontlasting dezer stoffe volbragt zijnde, weldra verligting der toevallen, en na het versterken der verslapt deelen, de geneezing volgde. Het blijkt dus dat dezen Etter geen voortbrengzel eener ontsteeking der bloedvaten kan zijn, maar eene in haare eigene vaten reeds ontaarde *Lympha*, welke nooit in een waaren Etter had kunnen veranderd worden, zelfs dan niet wanneer de Levenskracht verminderd was.

Proeven met deeze stoffe genomen schijnen dit ook duidelijk te bewijzen. Twee On-  
cen van den eersten Etter, in een gefloten  
fles,



fles, aan een matigen graad van warmte blootgesteld, bleef 7 dagen onveranderd; hij gaf een slijmig zetsel, ook werd de oppervlakte, met een dun en rimpelig vliesje overdekt en het Lakmoes papier eenigzints van denzelve rood geverwd. Den 8<sup>ten</sup> dag begon zig eene muffe en zuure reuk te ontwikkelen die het oog prikkelde. Het zetsel was nu minder slijmig, doch eenigzints roomachtig; met het proefmiddel van *Grasmeijer* vermengd, ontstond een ligt stremzel, terwijl men op deszelf oppervlakte een dun en geelgroen water zag drijven. Eén Once van deze stoffe, twee dagen later ontlast, en dikker en geeler dan de eerste, bleef 6 dagen zonder verandering, den 7<sup>den</sup> dag gaf zij een geelwit zetsel; met ontwikkeling eener zuure en muffe reuk, terwijl zij het Lakmoes papier eenigzins rood verwde. Na het te hebben omgeroerd, stremde het gedeeltelijk met het proefmiddel. Het dunne geele water er afgegoten en nog 6 dagen bewaard hebbende, scheidde 'er zich eene menigte roomachtige deeltjes, welke even als den besten Etter op den bodem van het glas gezien wierden, de stank wierd meer en meer rotachtig, en nu veranderde zij de kleur van het Lakmoes papier niet meer. Met  
versch

nieuw bereid Kalkwater werd de versche Etter-stoffe zeer ligt ontbonden, en verkreeg eene bleek-geele kleur, 'er zonderde zich na zij eenige uren in eene gesloten fles gestaan had, veele meelachtige stoffe af. Het vogt bleef groengeel en troebel; na eenige dagen wierd het helder, en van het zetsel afgegoten zijnde, bleven 'er eenige slijmige en kaasachtige deeltjes op het filtrum. Het zetsel ontbond zich gemakkelijk in warm regen water, maakte hetzelfde melkachtig, en plofte aanstonds weder neder. De versche Etter met kalkwater vermengd, bleef gedurende 20 dagen onveranderd zonder eenige reuk van zich te geven.

*Tiende Waarneeming.*

Eene Juffrouw van 25 jaaren, welke in hare jeugd altoos gezond was geweest, op haar 14de jaar de maandstonden gemakkelijk gekregen, en vervolgens altoos geregeld had gehad, wierd op haar 20ste jaar door eene geregelde anderen-daagsche koorts aangetast, welke voor geene middelen wilde wijken. De maandstonden bleven nu weg, waarna eerst een slijmerige, naderhand een melkachtige witte vloed volgde. Haar Geneesheer wendde tegen deze koorts, de Kina en andere bittere



re middelen in allerlije vorm, voornaamlijk met wijn of brandewijn getrokken aan, met tusfchenvoeging van herhaalde fterke buikzuiverende Middelen. Dan de Lijderes bleef zwak, en de onderbuik opgezet. De Kina met Staalviylzel werd hietegen in ruime giften gebezigd, waarna deze vloed wel eenigzins verminderde, doch zij kreeg eene amborftigheid met ophoesten van taaije flijm vergezeld. De opzetting van den buik nam allengs toe, waartegen, dan eens fterke buikzuiverende middelen en aderlaten, dan weder Kina met Staalviylzel &c. aangewendt wierden. De koorts kwam weder, en de witte vloed vermeerderde tevens. De voeten en de buik onder dit alles in dikte toenemende, werden 'er waterdrijvende middelen uit Loogzouten en zee ajuin, tusfchen beiden ook buikzuiverende middelen aan de Lijderes zonder eenige beterschap toegediend. De zwakheid nam toe, en de Kina met Staalviylzel wierdt op nieuws beproeft; de Lijderes bleef desniet-tegenftaande over het jaar in deze fukkelende toestand, en de Geneesmiddelen moede zijnde, liet zij haare herftelling aan de natuur over; Eenigen tijd daarna in het huwelijk getreden zijnde, werd zij werkelijk beter. De maandftonden kwamen weder; zij werd zwanger, ver-

verlostte voorspoedig, en had het genoeg haar kind zelf te kunnen zoogen. Dan dit genoeg duurde niet lang, dewijl haar kind na eenige weken stierf. De met zog opgevulde borsten mogten uit vrees voor verzwakking niet verder gezogen worden, en het zog moest met eene opdrogende pleister verdreven worden. Na eenige weken hiermede gefukkeld te hebben, verdween eindelijk het zog: dan niet lang daarna ontstonden vliegende pijnen in de leden en rug, met ongeregelde koortzen en benaauwdheid op de borst; een sterke melkachtige ontlasting uit de baarmoeder, verminderde deze ongemakken veel. Dan haare Arts bevreesd voor eene al te groote verzwakking, ging deze ontlasting met Kina, Staal en andere tesaumentrekkende middelen, zoo in- als uitwendig toegediend, tegen, waarop dan ook deze ontlasting verminderde; doch niet lang daarna vertoonden zich op nieuw de voorige toevallen, hierbij kwamen nu flauwtens, hartkloppingen, zwellings der voeten en eene hectische koorts. In dezen staat vond ik haar bij mijn eerste bezoek.

Haare voorige en tegenwoordige toestand overwegende, kwam het mij voor, dat door het aanwenden der zoogenaamde versterkende



middelen, en wel voornaamlijk door de uitwendige, als Rookingen enz. de loop welke de natuur zich gebaad had, verhinderd was, de eerste aanwijzing derhalven, welke hier in aanmerking kwam, was, deze loop te herstellen.

Ten dien einde liet ik dampbaden uit aftreksels van *Herb. Absynth. Rutæ*, en *Flor. Arnic.* bestaande, aanwenden, waarbij eene kleine hoeveelheid, *Spir. Salis ammon. c. C.* gevoegd wierd, en te gelijk inwendig van een drankje uit *Extract. Marub. alb. Card. bened. aa ʒʒ. Tart. emet. gr. ij. Syr. C. Aurant ʒj. Aq. Menth. pip. Aq. Flor. Chamomill. en Spir. Minder. aa ʒij.* alle 2 uren één lepel vol gebruiken. Het ophoesten van slijm wierd nu gemakkelijker, en na verloop van 3 weken herstelde zich de witte Vloed, zijnde eerst een geel-witte slijm, welke allengs vloei- baarer wierd. De benaauwdheid op de borst, de opgezetheid van den buik, en de zwelling der voeten verminderden nu aanmerkelijk. Mijn oogmerk tot dus verre bereikt hebbende, bleef mij nog over de verzwakte deelen te versterken, waartoe de koude aftreksels van een *Decoct. C. peruv.* met *Aq. Calc.*, zoo in- als uitwendig toegediend, de beste uitwerkingen deden; ver-  
min-

minderende hierdoor niet alleen de witte vloed, maar de krachten namen tevens toe. Schoon de buik nog eenigzins opgezet en hard op het aanraaken bleef. Op mijn raad deed de Lijderes veel beweging in de vrije lucht. Op een tijd in haaren tuin wandelende en zich voor over bukkende, gevoelde zij eensklaps persfingen niet ongelijk aan de Barenswéén ontstaan, welke door eene sterke ontlasting van een bleekgeele, maatik dunne en zeer stinkende stoffe uit de baarmoeder gevolgd wierden. De Lijderes wierd door de hevigheid dezer ontlasting en door het invallen van haaren buik dikwijls flauw; doch na dezelve met eenen breeden band omzwagteld en met koude omslagen van Azijn en *Spir. vin. Camphorat.* bevogtigd en te gelijk inwendig versterkende middelen toegediend te hebben, werd dit ongemak binnen korten tijd tegengegaan; nog eenige dagen sijperde uit de baarmoeder eene bleekgeele dunne doch weinig stinkende stoffe, welke van tijd tot tijd verminderde, waarna de buik haare natuurlijke gedaante weder kreeg, en de Lijderes zich zeer wel bevond. Ik liet egter nog eenige weeken met het gebruik van koude aftreksels van *C. peruv.* met *Aq. Calc.* aanhouden.

Twee maanden daarna kwamen de maandstonden weder, welke ook gedurende 6. maanden



den maatig en geregeld waren, wanneer de Lijderes Zwanger werd, gezond bleef en zeer voorspoedig verlostte, terwijl zij het genoeg had, haar kind 8 maanden lang zonder eenige hinder zelfs te kunnen zogen: maar nu begon het zog merkelyk te verminderen; waarop mislykheid, wansmaak en opgezetheid van den buik volgden, alle welke toevallen als zo veele tekenen van zwangerschap zo van de Lijderes als van haare Vriendinnen aangemerkt wierden; na eenige maanden egter verscheenen de maanstonen weder, doch de buik bleef even dik, terwijl de eetlust en stoelgang natuurlijk waren. Dan dit alles werd van de Vroedvrouw voor volbloedigheid gehouden en buiten mijn weten, eene ruime aderlating in het werk gesteld. Desniettegenstaande kwamen de maanstonen sterker weder, waarbij zich nog benauwdheid op de borst, hoest en zwellings der voeten voegden, en de buik al meer en meer in dikte toenam, welke dikte zich voornamelyk naar de linkerzijde schein te bepaalen, daarbij was de navel ingetrokken, en de borsten waren zeer slap: begerig om door onderslaan dit geval naauwkeuriger te onderzoeken werd mij dit geweigerd, 't geen egter aan de Vroedvrouw toegestaan werd, die daar op verzekerde, dat de Zwangerschap reeds in de 6<sup>de</sup>. maand ge-

gevorderd was. Schoon ik voor mij aan een en ander zeer twijfelde, ook bleef de Lijderes te vergeefs op andere tekens als bewegingen van het kind enz. die het gezegde der Vrouw moesten bevestigen, hoopen.

Eenigen tijd hierna ontstond eene hevige bloedvloeijing uit de Baarmoeder welke met pijn vergezeld was. De Vroedvrouw begreep nu dat de verlosfing op handen was, en verzekerde reeds het hoofd van het Kind te kunnen voelen. Dan hierin werd hare verwagting te leur gesteld, integendeel nam de storting hand over hand toe; welke daarenboven nog door zwaare flauwtens gevolgd werd. Thans mijne hulp ingeroepen zijnde, vond ik den mond der baarmoeder in zijne natuurlijke gesteldheid, doch in plaats van een Kind, trof ik veel geronnen bloed en slijmbrokken in de scheede aan, evenwel hield de Vroedvrouw nog staande dat zij het hoofd van het kind gevoeld had, en dat 'er reeds verscheiden stukken en brokken van het verteerde kind ontlast waren; doch 't welk bij nauwkeurig onderzoek niets anders dan geronnen bloed en slijm bleek te zijn. Ik was nu genoegzaam overtuigd van het bestaan eener *Pthysionia Uteri*, en richtte mijne geneeswijze voornamenlijk daarheen om de verslapte deelen tot meerdere werkzaamheid aan te zetten,



en de nog opgesloten stoffe uit te drijven; ten dien einde schreef ik pillen voor uit *G. Galbani - Hederæ. arbor. aa dr. ij. Extr. Aloës aq. dr. β. Calomel. gr. xxiv. Tinct. Succin. q s tot pillen van 4 grein*, hiervan liet ik 'er 4 maalen daags 5 gebruiken; teffens werd de buik met een *Linim.* bestaande uit *Camphor. dr. iβ. ol. olivar. dr. vj. Petrol. dr. ij. en Spir. Sal. ammon. dr. iij.* vlijtig gesmeerd, te gelijk liet ik haar eene flenelle Matras met *Hb. Absynth. Hb. Rutæ. Flor. Lavendul.* gevuld, en met *Spir. Vin. Camphorat. en Spir. Minder.* bevochtigd op den buik dragen. Hierna vermeerderde de ontlasting van eene geelgroene en taaije slijm uit de baarmoeder; ook werd met de pis welke door haren reuk den aart der gebruikte middelen aantoonde, nog eene groote hoeveelheid slijm naar buiten gebracht. Eenigen tijd hier na begon de kleur der slijm te veranderen welke nu bleekgeel en dunner werd, de buik slook nu; eetlust en stoelgang wierden natuurlijk, en de krachten namen toe. Ik liet nu het gebruik van de *Calomel* agter, doch gaf in deszelfs plaats het *Extr. C. peruv. met Flor. Sal. ammon. mart.* en eenige weeken hiermede aangehouden hebbende, kreeg de buik derzelver natuurlijke gedaante weder. De wrijvingen wierden nu agter gelaten, en slechts de Matras gedragen. De melk-

melkachtige vloed hield thans geheel op, en de krachten herstelden zich, ook kwamen kort daarna de maandstonden te rug, welke vervolgens zeer geregeld waren, waarop eene gemakkelijke Zwangerschap en voorspoedige verlossing van een gezond Kind volgde.

*Aanmerking.*

Ook in dit geval vinden wij veele Modificatien, welke onze overweging overwaardig zijn; dan om niet te veel uitteweiden, zal ik hier slechts eenige aanmerkingen bijvoegen.

Wanneer wij onzen aandacht op den oorsprong dezer ziekte vestigen, dan zien wij ten klaarsten, dat de terug gedrevene ziektestoffe, welke zich niet alleen in de eerste wegen, maar ook in de tweede en volgende ophield, niet door enkele braak- en purgeermiddelen ontlast, en terstond daarop de aangedaane Zenuwen door Kina en staal in haare vorige gesteldheid gebragt konden worden, maar dat daardoor veeleer de poogingen der natuur tegengegaan wierden, om dezelve langs de geschikte wegen naar buiten te voeren. Wij zagen derhalven deze stoffe van tijd tot tijd aangroeijen, en zich eindelijk eenen uitgang langs de baarmoeder baanen, dan hierin tegengegaan wordende, moesten noodwendig



nadelige gevolgen ontstaan; welke echter na dat de krachten zich allengs hersteld hadden, en de weg welke de natuur tot ontlasting der stoffe gekozen had geopend was, dadelijk gestuit werden. — Wij zagen verder de uitwerksels van een door aandoening veranderd, en teruggeweeken zog, doch ook te gelijk de heilzaame poogingen der Natuur, om dit ont-aart vogt langs den gewoonen weg, de baarmoeder, te ontlasten. Dan daar zij ook hier in belet werd, ontsbonden weldra de vorige ongemakken welke echter zodra de ontlasting hersteld was, spoedig verminderden. —

Men wil thans de verplaatzingen zo wel van het zog als die der overige ziektestoffen geheel verwerpen, en de daarvan af te leidene gevolgen alleen aan de Zieklijke werkingen der Zenuwen toeschrijven. Gaarne stem ik toe, dat het gezonde Zog van de inzuigende vaatjes weder opgenomen, en met de overige *Lympha* weder geassimileerd kan worden, zonder dat daar uit eenige nadelige gevolgen ontstaan, gelijk de daaglijksche ondervinding ons leert; dan geheel anders is het met een door aandoeningen verandert en ont-aart zog gesteld. Zodanig zog werkt reeds in de watervaten en derzelver klieren als een vreemde prikkel, verwekt in dezelve krampen, waaruit ophooping, verstopping, zwelling enz.; ont-

ontstaan moeten. Vervolgens onder het bloed gebragt, ziet men weldra de hevigste prikkelingen, tegenwerkingen en weder afscheidingen ontstaan; maar deze afscheidingen geschieden juist niet altoos langs de gewoone wegen; fomtijds vinden wij hetzelfde in de inwendige holten of in het celweefzel uitgestort, gelijk dit niet zelden in dat der vrouwlijke teeldeelen waargenomen wordt. Wanneer nu deze afscheidene stoffe langs deze deelen naar buiten gevoerd wordt, dan noemt men dezelve veelal eene *witte vloed*, en niet zelden zien wij, dat, na deze ontlasting, de te vooren plaats hebbende toevallen ophouden. — Wanneer integendeel deze vloed te vroegtijdig opgestopt wordt, zijn benaauwdheden en slijmhoest niet zelden het gevolg. Een gedeelte dezer stoffe wordt als dan van de inzuigende vaatjes weder opgenomen, en waar zij zich plaatst, veroorzaakt zij tegennatuurlijke prikkelingen; waarvan het gevolg zijn krampen, ophooping, of wel uitstorting van dezelve.

De voorbeelden zijn immers niet zeldzaam, waar bij men naar het ophouden van deze soort van witte vloed, benaauwdheid en slijmhoest waargenomen heeft, en daarentegen na het ontstaan eener witte vloed de borstziekten heeft zien verminderen. Men vind dit onder anderen reeds van *Ballonius* opgetekent in zijne



ne *Epid. & Ephemer. L. I. p. 53.* „ *Chirurgi*  
 „ *Uxori Tusfis valida & diuturna expectorabat*  
 „ *& facili. Tum tusfis fuit sicca, verebantur ne*  
 „ *suppressione materiae aliquid alienius contingeret.*  
 „ *Tandem, ac si ab albis molesteretur sinus pu-*  
 „ *doris aqua malet, & transmittitur ea materia*  
 „ *a pulmonibus ad pudenda.*” Mark verhaalt  
 (Abh. v. d. Schwindfucht s. 88. g.) een ge-  
 val van eene Dame, bij welke de witte vloed  
 na het gebruik van mineraale wateren weg  
 bleef, waarop een hardnekkige catarrhale hoest  
 ontstond, welke eene Longteering en einde-  
 lijk de dood ten gevolge had, en maakt hier-  
 bij deze aanmerking. „ Es ist wahr, wenn  
 „ nur eine außerordentliche Erschlaffung der  
 „ festen Theile, so wohl des ganzen körpers  
 „ als der Muttertheile die Ursache des weis-  
 „ sen Flusses ist, so hebet man dieses Uebel  
 „ auch solche mittel, welche die erschlafften  
 „ festen Theile stärken; solche sind die stär-  
 „ kende mittel ueberhaupt und die stahlwasser  
 „ ins besonder: da dieser aber oft von einer  
 „ Scharfe ihrer Art, die sich auf die Mutter-  
 „ theile geworfen, begleitet ist, und der  
 „ körper derjenigen, die daran leiden, durch-  
 „ gängig mit schleimigten, zähen und schar-  
 „ fen lästen angefüllet i. t, so ist es nicht ge-  
 „ nug den festen Theilen ihre stärke wieder  
 „ zu verschaffen, sondern man muss alsdan  
 „ „ erst

„erst sich derjenigen mittel bedienen, die  
 „den Schleim im Blute (?) Zertheilen, fei-  
 „ne wässerige Beschaffenheit und schärfe  
 „verbesseren, bevor man ausdrokenende zu-  
 „sammenziehende mittel anwendet.” —

Bij *Licutaud* (*Hist. Anatom. med. a Portal Vol. II. Obs. 41.*) vinden wij „*Mulier vix quin-*  
 „*tum lustrum emensa fluore albo, doloribus ab-*  
 „*domine & costis stipato laborabat. Vires defi-*  
 „*ciebant & ardore urinæ quærebatur, cum in-*  
 „*signi vomitu, qui notissimis remediis impugnatur.*  
 „*Interea paucior fit fluor albus & sensim pluries*  
 „*desinit. Hanc sufflammationem presso pede se-*  
 „*quitur tussis cum sputo pituitoso, dein cruento*  
 „*ac demum purulento. Accedunt febris lenta et*  
 „*tabes, quæ brevi ægram ad libitinæ rationem*  
 „*ducunt. Plus æquo tumebant intestina tenuia*  
 „*& constricta occurrebant crassa. Mesente-*  
 „*rium obstructum deprehenditur. Reperiuntur*  
 „*in latere sinistro binæ glandulæ bronchiorum*  
 „*nucem æquantes, materiam sebaccam continen-*  
 „*tes. Pulmones erant passim exulcerati & sa-*  
 „*niosi & tuberculis scatentes.”* (*Raulin*) —

En *Weikard* (*Med. Fragmenten und Errinner. f. 121.*) heeft bij eenige Vrouwen, na het terugblijven van de witte vloed eene kwijling. Soms tijds ook eene ontlasting van witte slijm door den stoelgang waargenomen.

Vraagt



Vraagt men nu langs welke wegen deze verplaatsing geschied is? Dan kunnen wij geene andere dan die der watervaten plaats geven, schoon dan nog de zwaarigheid overig blijft, om te bewijzen, hoe dit geschieden kan, zonder dat deze stoffe verders onder het bloed gebracht word? *Blizard* tragt ons dit op de volgende wijze te verklaren.

„ Die absorbirende Gefäße sind in der that  
 „ die Ausführungs - werkzeuge aller festen  
 „ und flüssiger Theile unsers Körpers, nur  
 „ diejenigen Organen ausgenommen, die  
 „ wirkliche Ausgänge haben, ja zuweilen  
 „ kommen sie auch selbst diesen zu Hülfe.  
 „ Ihre Wirkung wird daher durch die Quantität der fecernirenden Masse geleitet und  
 „ bestimmt. Wenn daher der gemeinschaftliche der Galle gewidmete Ausleerungsgang verstopft ist, so kommen die einfangenden Gefäße offenbar dem Ausführungssystem der Leber, durch Aufnahme der Galle, zu Hülfe, und wenden dadurch einen Theil der Gefahr ab, welche sonst daher zu befürchten wäre. Diese ins Blut zurückgeführte Galle wird alsdan durch manche Absonderungsgefäße aus dem Körper herausgeschafft.

„ Auf eben dieser Art werde oft ein an-  
 „ sehn-

„ fehnlicher Theil des Harns in der Ifchu-  
 „ rie abforbirt, und in verfcheidenen Arten  
 „ der Wafferfucht und manchen andern  
 „ krankheiten durch gleiche Beijhülfe der  
 „ Natur die nachtheiligen Folgen afgewen-  
 „ det, Heilung und Genefung bewirkt. —  
 „ Die Natur hat auf eine vortrefliche und  
 „ wohlthätige Art dafür geforgt, daß keine  
 „ fort von Materie oder von Säften gerade-  
 „ zu und unmittelbar ins Blut und in die  
 „ Blutgefäße dringen könne, ohne durch die  
 „ abforbirenden Gefäße, geprüft, geleitet,  
 „ gleichfam afgewogen, und mit der Feuch-  
 „ tigkeit diefer Kwäle vermifcht zu feijn.  
 „ Hierdurch wird in einem gewiffen Grade  
 „ ihre Natur verändert, ehe fie in die Blut-  
 „ mafse kommen. Daher rührt es, daß al-  
 „ lerlei Dinge, ob fie, gleich ihrer natur  
 „ nach, milde und unfehädlich fcheinen, wenn  
 „ fie unmittelbar in die Blutmafse gebracht  
 „ worden find, die unerwartetften, fonder-  
 „ barften und oft tödtliche Wirkungen her-  
 „ vorbringen.” (*W. Cruikshanks Gefchichte  
 und Befchr. der Saugadern des Menfchl. Körp.  
 2. B. mit Anmerk. und Zufätsen verm. v. D.  
 C. Fr. Ludwig.*)

En het is ook op deze wijze dat men de  
 we-



wederopneming van het reeds afgescheiden Zog verklaren moet.

Eindelijk zagen wij in dit geval na de ontlasting van eene groote hoeveelheid melkachtige en slijmachtige stoffe, een soort van etter ontstaan, waarvan men noch de wijze waarop zij voortgebracht werd, noch de plaats waar zij zich opgehouden heeft, gemakkelijk verklaren kan. Had hier in de teeldeelen of elders, te vooren eene verborgene Ontsteeking plaats gehad? Dit is niet waarschijnlijk; ook hebben wij geene verschijnzelen bespeurd, welke dit moesten aantoonen, en kunnen dus vast stellen, dat het geen waare Ontsteekings-etter, maar eene gemodificeerde *Lympha* en *Serum*, welke stilstaande en van hare levenskracht berooft, zeer geschikt tot eene verdere chemische Ontbinding was. Wij vinden dergelijke voorbeelden bij *Morgagni*, *Lieutaud* enz. waar eene soortgelijke etter in de vrouwlijke teeldeelen waargenomen wierd; niet zelden ontmoeten wij ook in de buikwaterzucht, eene dergelijke stoffe, of zien het afgetapte water een zodanig zetsel vormen, 't welk veele gelijkheid met den etter heeft. Men vind in *Starke's Archiv der Geburtshülfe* 4. B. 3. St. van *Prof. Siebold*,

*bold*, den jongen, eene waarneeming van eene Waterzucht bij eene Zwangere Vrouw, waar het afgetapte water een zetsel maakte, 't welk met Grasmaijers proefmiddel een Gelei opleverde, in allen opzigten gelijk aan die, welke men in den besten Etter waarneemt, en waar over de *Hr. Siebold* deeze aanmerking maakt:

„ Nach Grasmaijer soll nur das Eiter seijn,  
„ was mit Alkali fixo die im Versuche erhal-  
„ tene (18. c.) Gallerte ausmacht. Nach  
„ andern (*Wedekind*) ist die *generatio puris*  
„ *absque inflammatione* der Aeltern eine Pa-  
„ thologische Potze! Soll die Menge dieser  
„ Materie die Folge andaurender sogenannten  
„ chronischen Entzündung seijn? Nach *We-*  
„ *dekind* ist chronische Entzündung abermals  
„ eine Potze! sondern nur eine Kette fortlau-  
„ fender und sich jedesmal beeindigender acu-  
„ ten Entzündungen — Zumal am Darm-  
„ kanal. Oder fängt nach jeder Abzapfung  
„ die Reihe dieser an einander fortlaufenden  
„ acuten Entzündungen von neuem an? Das  
„ anzunehmen, wo sind die Beweis- und be-  
„ wahr-scheinlichen Gründe? Also eine aber-  
„ mahlige Potze! Seine Gründe sind scharf-  
„ sinnig. Was würde im gegenwärtigen  
„ Falle vor eine Entzündung da seijn müssen,  
„ von welcher ungeheuren grossen Umfange?

E

„ Und



„ Und das ohne alle — ohne die geringste  
„ Aeusferung von entzündlichem Schmerz?  
„ Und für einem einzigen Fleck wäre den-  
„ noch die Absonderung und Anhäufung ei-  
„ ner solchen Feuchtigkeit in zo kurzer Zeit  
„ wahrlich viel!

„ *Mezler* fecirte eine Frau, die eine dieser  
„ Feuchtigkeit im Leibe hatte, und fand nicht  
„ die geringste Spur von Entzündung beij fei-  
„ ner Befpieglung dieser Krankheit in der Lei-  
„ che? Hier kommen wir wohl auf dem  
„ Scheideweg, und eine Partheij muſs verlie-  
„ ren; entweder giebt es Eiter ohne Entzün-  
„ dung, oder das, was *D. Grasmeyer* für Eiter  
„ hält iſt nicht Eiter.“ Hier maakt *Prof.*  
*Starke* deeze aanmerking. „ Beij dieſem Strei-  
„ te iſt wohl zu unterſcheiden, unter dem  
„ was wirklich Eiter iſt, was wie Eiter aus-  
„ ſieht und doch nicht iſt, und was nicht wie  
„ Eiter ſieht, ſondern nur molkicht iſt, oder  
„ eine ähnliche Beſchaffenheit hat. Sollte  
„ wohl von letzteren *Wedekind*, *Grasmeyer*  
„ und *Mezler* geſprochen haben? — Soll  
„ wahrer Eiter erzeugt werden, ſo iſt noth-  
„ wendig eine beſtimmte Vermehrung des  
„ Wärmestoſs, als das erſte und gröſte Hülfs-  
„ mittel der Entzündung, erforderlich. Ich  
„ glaube alſo, daß nie ein reiner Eiter ohne  
„ Ent-

„Entzündung entsteht, das übrige ist eine  
„feine chemische Mischung, Zerfetzung und  
„Zusammenfetzung der Natur.” Dit stem ik  
volkomen toe, dat tot de voortbrenging van  
een waaren herstellenden Etter eene vermeer-  
derde levenskracht en dus ook een hoogere  
graad van warmtestof nodig is. Maar wat  
naam zullen wij aan zodanige stof geven, die,  
gelijk in mijne waarneming, de waare gedaante  
van Etter heeft, en met het Proefmiddel van  
*Grasmeijer* de proef houdt? Kan eene veran-  
derde uitgestorte *Lympha* en *Serum* aan zich  
zelve overgelaten en van den invloed der le-  
venskracht beroofd, niet eindelijk tot een  
zuure — of, volgens de stelling van eenen  
nieuwen naamloozen Schrijver (Ueber die  
Faulniss lebender und todter thierischer  
Körper &c. Hildburghausen 1795.), het phos-  
phorzuur de overhand nemen, allengs verbran-  
den en tot de rotting overgaan? Geschiedt  
dit niet ook bij den besten Etter, wanneer hij  
aan zich zelve overgelaten en van den invloed  
der levenskracht beroofd wordt; neemt niet  
ook alsdan de verbranding des phosphors en  
dus ook de verrotting de overhand? — Wij  
vinden ja meermaalen de ingesloten vogten  
zodanig tot bederf overgegaan, dat men aan



deeze stelling bijna niet twijfelen kan. Ik zal van dien aart nog ééne Waarneming hier plaatsen.

*Elfde Waarneeming.*

Een Heer uit deeze Stad (Campen) een reis in Holland langs de zeekust, in de maand Augustus, eenige uren te voet doende en zich zeer verhit hebbende wierd door een opgekomen sterken regen en wind doornat en koud, en moest in dien staat nog eenige uren in een open schuit zitten. Eenige dagen daarna kreeg hij eene zwaare verkoudheid, welke eenige weken aanhield, waarna hij zich weder wel bevond. Eenige maanden na zijne te huis komst bespeurde hij in 't onderlijf eene doffe pijn, welke hij meende van wormen te ontstaan, en waar tegen hij eenige huismiddelen gebruikte. Dan deeze pijn hield aan met vermindering der krachten en de Lijder vermagerde zeer. Allengs verspreidde zich de doffe pijn naar beneden, tot aan het schaambeek en rechter liesch, waar zich eindelijk eenige dikte vertoonde, welke de Lijder voor een breuk hield. In deezen staat verbleef hij tot in de maand Maart  
daar

daar aan volgende, wanneer zijn rechter been allengs doof en onbruikbaar wierd, even als of het verlamd was; hier bij voegde zich nu eene anderendaagsche koorts met groote zwakheid en flauwtens bij ieder aanval, en na deeze volgden vliegende pijnen in alle zijne leden. De koortskoude hield eenige uren aan, waarop de hitte en vervolgens een kwalijk riekend zweet en troebele stinkende urin volgde, die, kort daarna gezakt zijnde, een dik en geelrood zetsel maakte. Nu eerst wierd ik tot hulp geroepen. Ik vond den Lijder ten uitersten zwak en vermagerd, met eene vaale kleur, geelagtige oogen, de tong met eene geele korst bedekt, den adem zeer stinkende, de pols zeer klein en tusfchenpoozende, den buik week, maar eenigzins opgezmet met rommelingen van winden, welke ontlast wordende ijsfelijk stonken. Boven de *Crista ilei* vond ik eenige verhevenheid, die echter week en vlak was, in 't bevoelen iets pijnlijk, zich uitstrekken tot in de liesch, en, op deeze zagt drukkende, bespeurde de lijder eene bevende beweging en een bijzonder gevoel van pijn langs den buik en wierd terstond flauw. Het been was zeer vermagerd en bijna onbeweeglijk. Deeze toevallen overweegende, bleek mij uit alles, dat 'er hier



eene vergaderde ontaarte stoffe plaats had, en vermoedlijk door derzelver gedeeltelijke weder inzuiging in de watervaten en verdere overgang in den bloedstroom, de koortsen, verzwakking enz. afkomstig waren; dat 'er wel een gedeelte der opgenomen stoffen weder afgescheiden en naar buiten gevoerd werd; maar deeze natuurpoogingen te onvoldoende zijnde, en voor de bezwijking der natuur vreezende, was dus mijne eerste zorg de stoffe in haare vergaderplaats meer en meer te bepaalen, ten einde zo spoedig mogelijk dezelve aldaar te doen ontlasten. Scherpe pappen van Mostert en *Sal Ammoniac* wierden ten dien einde opgelegd, en inwendig de *Kina* met rooden wijn gegeven. Het gezwel verheef zich geenzins; ik lag 'er nu het *Empl. resolv. Schmuckeri* en *Empl. Vesicator.* op; en dit 6 dagen gelegen hebbende, bespeurde ik eenige golving en stelde den Lijder voor de noodzaaklijkheid van de spoedige opening van dit gezwel, welke nu ook zelve daarna verlangde; dan de bijgeroepen Heelmeester maakte veele zwaarigheid om dit te doen, betuigde geenens etter daar in te kunnen ontdekken en wilde vooreerst met weekmakende pappen den etter tot rijpheid brengen. Met veele moeite hield ik dit tegen; Ik moest even-

evenwel toestaan dat 'er nog vooraf een pleister opgelegd werd: dan meer en meer slook het gezwel en de Heelmeester meende reeds de stoffe daar uit verdreven te hebben: De Lijder wierd zeer zwak en kreeg dikwijls flauwtens; de buik wierd meer opgezét; braaking en hik volgden en men vreesde voor eene nabij zijnde dood. Ik drong nu sterk aan op de opening van het Gezwel, welke dan eindelijk geschiedde. Er ontlaste zich bij de 18 oncen geele, maatig dikken en ijsfelijk stinkenden etter. De wond los verbonden zijnde, bleef de ontlasting van deezen stinkenden etter nog vijf dagen aanhouden, wanneer dezelve in stank en hoeveelheid verminderde, wordende thands de drukdoeken bevogtigd met het *Decoët Salic. albæ* en *Spirit. Camphor.* en de inspuitingen van het zelfde *Decoët.* met *Tinct. Myrrhæ* en *Mel Rosar.* gebezigd; na verloop van 24 dagen floaten zich de holtens van boven aan de *Crista ilei*; 'er sijperde slechts nog eenige heldere *Lijmpha* uit de wond, welke zich ook kort daarna float: maar in de liesch en dije bleef de etter nog verscholen, die men met drukdoeken niet naar boven kon leiden; 'er wierd dan eindelijk ook hier eene opening gemaakt, waaruit een maatig dikke en weinig stinkende



bleekgeele etter liep, welke uitvloeijing nog verscheiden weeken aanhield. De beweging van het been herstelde zich ras weder; deeze holtens flooten zich eindelijk ook, en de Lijder herstelde volkomen onder het gebruik van Kina en rooden wijn.

### *Aanmerkingen.*

Ook hier vonden wij eene menigte stinkenden etter, welke door het proefmiddel van *Grasmeijer* alle eigenschappen van een taaij gelei, gelijk de beste etter, bezat. — Had hier eene chronische of verborgen ontsteeking plaats gehad, die deezen etter heeft voortgebracht? Wij willen dit wat nader overweegen.

Overweegen wij dan de gelegenheid gevende oorzaaken, zo waren deeze, een door het gaan verhit en bezweet — vervolgens door de daarop gevolgde regen en wind nat en koud geworden ligchaam.

Door het gaan wierd niet alleen de bloedstroom en deszelfs afscheidingen door de huid en longen enz. vermeerderd, maar tevens ook de inzuiging der van buiten aangebragte vreemde stoffen bevorderd. Nu volgde eene schielijke verkoeling door den wind en regen, waardoor niet alleen eene groote koude veroorzaakt

en

en bij gevolg eene menigte uitwaasfemings zweet en vreemde stoffe ingezogen werd. De Watervaten dus overladen met deeze vreemde deelen, voerden een gedeelte in de bloedvaten; dan welras wierden deeze geprikkeld zijnde tot meerdere tegenwerkingen genoodzaakt, de afscheidingen dus ook vermeerderd: 'er volgde eene verkoudheid en alzo wierd deeze scherpte, door de neus, longpijp, zweet en pis, weder ten spoedigsten ontlast, waarna zich de lijder eenigen tijd vrij wel bevond. Eerst 3 maanden daarna bespeurde hij de stompe pijn onder den navel, blijvende tot dus ver zonder koorts, of eenig ander teken van eene ontsteeking. De krachten verminderden allengs: langzaam geschiedde de zwelling, welke maatic gespannen bleef. Waar waren nu de tekenen van eene Peritonidis of van de ontsteeking van eenig ander deel? Wij vinden trouwens bij *Lieutaud* (*Hist. Anat. Med. L. I. Obs. 3.*) de ontsteeking van het Peritoneum met de hevigste pijnen en heete koorts vergezeld en wij ontmoeten dezelve soms bij kraamvrouwen met het hevigste gevoel van pijn. Maar wij vinden daarentegen weder bij *Morgagni* (*de sed. & caus. Morb. Epist. 57. 20.*) en bij *C. Medicus* (*Samml. v. Beobacht. &c. S. 206—441*)



*e. m. a.*, veel stinkenden etter tusschen het Peritoneum en andere plaatsen zonder blijken van eene voorafgegaane ontsteeking. Dan de ondervinding leert ons ook, dat ontsteeken in de buiks ingewanden kunnen plaats hebben zonder een sterk gevoel van pijn, dewijl 'er aan deeze deelen eene bijzondere zenuwgesteldheid, eene verhoogde werking zonder gewaarwording plaats kan hebben; waarvan ons de *Prof. Hufeland* in zijn voortreffelijk werk, de *Pathogenie* (S. 97. 98. 99.) zeer goed verklaart. „ Diese Nervenwirkung „ zeigt sich am deutlichsten in den Eingewei- „ den des Unterleibes, allen Sekretions werk- „ zeugen und den meisten natürlichen und Le- „ bens Verrichtungen. Vorzüglich scheint „ der *Intercostalnerve* und das *Par vagum* der „ Hauptsitz dieser Art von Sensibilitaet zu „ seijn, und das wichtigste zwischen Organ „ zwischen Seelen Sensibilitaet und animalischer „ Nerven Sensibilitaet. Durch sie erhalten „ die abdominal eingeweide eine ausseror- „ dentliche Menge Nerven, die sich in den „ mannichfaltigsten Richtungen durchkreuzen „ und eine Menge Geflechte bilden, ohne daß „ sie dadurch mit der Seele in Verbindung ge- „ setzt würden, sondern blos um jene topischen „ Reactionen und Consensus möglich zu ma- „ chen.

„ chen. Es entsteht daraus gleichsam ein eig-  
„ nes Nervensystem, das seine eignen Sijm-  
„ pathien, Vereinigungspunkte und Grenzen  
„ hat, und worauf die Seele nur unvolkom-  
„ men und bedingten Einfluß hat. Und  
„ wenn wir nun bedenken, daß diese Abdo-  
„ minal-nervengerade die allermeisten Ganglia  
„ haben, daß der ganze Intercoftalnerve ur-  
„ sprunglich aus bloßen Ganglien entsteht,  
„ fo bekommt gewis obige Meinung über  
„ ihrer Bestimmung einen hohen Grad von  
„ Wahrscheinlichkeit. Doch ist hiebei eine  
„ Bemerkung nöthig. Ohngeacht nämlich im  
„ gefunden Zustände sich keine Verbindung  
„ der Seele mit diesen Nerven zeigt, fo kön-  
„ nen doch Pathologische Zustände kommen,  
„ wodurch eine stärkere Erregung der Ner-  
„ venkraft dieses Theils, oder durch eine an-  
„ dere Richtung, oder durch einen sehr starken  
„ und ungewohnten Reiz, eine Fortpflan-  
„ zung der Perception bis zur Seele, oder  
„ zum Bewustseijn möglich wird. — Denn  
„ so kan Z. E. bei heftiger Reizung solcher  
„ Theile Schmerz empfunden werden. Hier  
„ scheint gleichsam die Heftigkeit des Anstos-  
„ ses jene natürliche Stimmung seiner Propa-  
„ gation zu überwältigen; doch ist diese Art  
„ von Empfindung eben deswegen sehr unbe-  
„ stimmt



„stimmt und precair, und daher läst sich erklären.

„Einmal, warum bey Entzündungen und schmerzhaften Zufällen im Unterleibe die Kranken den Schmerz oft an einem andern Ort fühlen, als dem wahren. Zweitens, warum die heftigste Inflammation im Abdominal-eingeweiden zuweilen da seijn kann, ohne dafs die Kranken den geringsten Schmerz empfinden.”

Dus zien wij wel ten duideliĳksten, dat 'er bij de ontsteekingē der Buiks ingewanden, juist niet altoos hevige pijnen plaats vinden, en alzo hier in ons geval eene verborgene ontsteeking tegenwoordig had kunnen zijn, waardoor deeze Etter voortgebracht was. Maar uit welke toevallen zoude men dezelve hebben kunnen opmaaken? Gelden ook hier niet de voorgaande aanmerkingen van *Siebold* en *Wedekind*? Overweegen wij hier de voorafgegaane toevallen, de gelegenheid gevende oorzaken, dan duiden dezelve alle meer op eene verminderde dan verhoogde Levenskracht; en beschouwen wij verder de deelen, waar deeze Etter vergaderd en (misſchien) gemaakt wierd, dan is het Peritoneum de hoofdplaats van dezelve. Dit deel is — gelijk bekend is — met weinig zenuwen begaafd, maar vol van bloed-

vaten en even zo veele ja nog meerder waternvaten, waar dus de afscheiding en wederinzuiging groot moet zijn; een deel derhalven zeer geschikt tot Erijsipelateuse ontsteekingen, in 't welk zelden een goede of waare etter bereid wordt, dewijl de reactie der vaten niet lang kanaanhouden; waarom hier geen waar Absces, maar eene uitstorting van Lijmpha en Serum voortgebracht wordt; de Lijmphatieke vaten haare kracht verlooren hebbende, om dit uitgestort vogt weder op te neemen, blijft dit vogt ingeslooten en ont-aart eindelijk allengs in een stinkenden etter. — *Walter* (*de Morbis periton. & apoplexia* § 37.) wil daarom ook geenzins de waare ontsteeking als de eenige oorzaak van deeze soort van etter aanneemen, maar schrijft de oorzaak daarvan toe aan de langzaame of spoedige verwijding der bloedvoerende Vaten.

Overweegen wij verder de gewoone gevolgen van eene waare ontsteeking, dat 'er namelijk bij dezelve eene Lijmpha wordt uitgestort, welke zich ligt in membranen en pseudomembranen formeert, waardoor weder aangroeiingen der deelen ontstaan; dan vinden wij hier in ons geval het tegendeel plaats hebben; hier immers was eene rottende stoffe.

Dan,



Dan, evenwel gaf zij met het Grasmaijersche proefmiddel het teken van waaren Eter; zij veranderde in een maatig Gelei, na dat men dezelve 10 minuten lang geroerd had? — Het is ook mogelijk, dat 'er in 't begin der ziekte eene active ontsteeking aan dit deel of elders heeft plaats gehad, die allengs in eene pasfve is veranderd, waardoor dan geen ware vormende, maar door de meer en meer verminderde Levenskracht, een vernielende Eter is voortgebracht.

Ik gevoel zeer wel het onvoldoende van deeze verklaring, en reikhals naar de oplossing van deeze vraag door deezer zaak meer kundigen en doorzienden.

Bij deeze gelegenheid zal ik hier nog eene Waarneeming van een Gezwel, welk wel niet tot de Ettergezwellen behoort, maar waar van de inhoudende stoffe van een bijzonderen aart en stank was, en vrij van rotting, mededeelen.

### *Twaalfde Waarneeming.*

Bij eene Vrouw van 50 jaaren geroepen zijnde, vond ik onder den Trochanter major van het rechter been een Gezwel van omtrent 8 duimen in zijn omtrek; in 't midden

den van hetzelfde was eene kleine opening. In het bevoelen was het zelve zeer korlagtig, als Gort in een Zak, onpijnlijk, maar soms voelde de Lijderes steekingen en jeukte in den omtrek van het gezwel. De Vrouw verhaalde dit Gezwel reeds voor 30 jaaren door een val gekregen te hebben; terstond na den val was de dikte zeer gering en wierd slechts met brandewijn gewasfchen; verders zeide zij, dat het van jaar tot jaar in grootte was toegenomen, zonder eenig ongemak, dan alleen nu en dan steekingen en jeukte er aan bespeurd te hebben. — Ik bragt in de kleine Opening een klein zoekijzertje, en kwam met weinig moeite een duim diep; het zelve er uitgehaald hebbende en op het Gezwel drukkende, kwam er eene stoffe uit als gekookte en gepelde Garmaaln, van omtrent eenen duim lang, sommige langer, andere korter. Deeze stoffe stonk allerhevigst, en geleeleek zeer naar knoflook. De wonde verwijdde zich eenigzins door het drukken en wrijven, waardoor 'er al meer en meer van dezelfde stoffe uitliep. Bij de 2 Oncen voor deeze reis 'er uitgedrukt hebbende, bragt ik het zoekijzertje rechtlijs tot aan de bloote Femur, maar kon geen beenbederf bespeuren.

Des



Des anderen dags kwam er al weder door het drukken en wrijven bij de 3 Oncen van dezelfde stoffe uit, zonder eenig vogt daar onder te bemerken. Schoon nu uit het midden van den zak eene groote hoeveelheid van deze stoffe ontlast was, bleef er echter rondomme nog van dezelve onbeweeglijk zitten. Ik spoot dus den zak vol met water, honig, *Tinct. Myrrh.* en *Spir. Sal. Ammon. caust.* Dit verwekte weinig gevoel; ik hield vervolgens de wond toe en wreef de harde randen, waarop zich al meer en meer harde langwerpige brokjes ontlasteden; waarmede ik nog 8 dagen met hetzelfde gevolg voortvoer. Maar nu volgde na het uitdrukken een meer kleverig, melkagtig vogt, zonder eenigen stank; de harde stoffe verminderde. Het inspuiten verwekte ook meer gevoel, ik liet dus den *Spir. Sal. Ammon. c.* weg, en spoot slechts de *Tna. Myrrhæ* met *Mel Rosar.* in; vulde van buiten de holte met drukdoeken, bevogtigd met *Spir. Camphor* en *Spir. Sal. Ammon.* en lag daar op een welsluitend verband. De holte sloot zich allengs, en na 14 dagen bevond ik, dat dezelve zich geheel geslooten had, blijvende eene kleine opening nog voor eenige weeken overig, waar uit eenige druppelen van geelwitte en iets lijmige stof-

stofte zijperde, zonder eenige stank of ander ongemak, waarna ook deeze kleine opening zich allengs geheel sloot.

### Aanmerkingen.

Men zal hier zeker de aanmerking maken, dat ik den zak verder had moeten open snijden, om de stofte in ééns te ontlasten; dan hiertoe was de Lijderes niet wel te krijgen; en ik drong 'er zo sterk niet op aan, dewijl ik tevens voor erge gevolgen vreesde, niet zo zeer door de verwijding, als veel meer door de kwaade gesteldheid van het gezwel zelve; dus wilde ik eerst afzien, wat 'er van worden zoude; en daar ik zag, dat de ontlasting der stofte door de drukking en wrijving voldoende was; wat behoefde ik dus meer te doen?

Wat was nu deeze stofte? Eene te vooren uitgestorte en zodanig ontaarte *Lympha*? — Een bederf der *fascia lata*, en verder van de *Cellulosa*? — En dit alles zonder eenig blijk van ontsteeking of van scirrheuse verharding? — Hoe wierd deeze stofte zo bijzonder stinkende? Hier was toch immers geene verrotting? — Zeer spijt het mij, deeze bijzondere stofte wegens mijne toenmaali-



ge onpasfelijkheid niet te hebben kunnen onderzoeken. — De onlijdelijke ftank van dezelve bleef den geheelen dag aan mijne vingeren, en liet zich met geen afwasfchen noch reukmiddelen zo ligt verdrijven.



TWEE.

TWEDE AFDEELING,

---

PROEFNEEMINGEN.

---

Reeds federd eenige jaaren was de etterwording en derzelver verscheidene aart het Onderwerp mijner naspeuringen, dewijl ik in mijne voormalige woonplaats (te *Almelo*) waar ik tevens de uitwendige Geneeskunst uitoeffende, meermaalen gelegenheid had, de Etterziekten te behandelen: dus maakte ik, zo veel mijn tijd toeliet, de proefneemingen met verschillende stoffen, waarmede ik, volgens de Theorie van anderen, meende het geheim der natuur van de Etterwording ontwaar te worden. Door de proeven van PRINGLE (\*) en GABER (\*\*) meende ik zeker dit geheim der natuur

(\*) Verh. over de Legerziekten benevens Proev. over de rotting door den Hr. J. PRINGLE, vert. door L. BICKER, 3. D.

(\*\*) Nieuwe Proeven over de Verrotting der dierl. Vogten, in de Natuurk. Verh. D. 3. S. 274.



tuur gevonden te hebben, te meer, daar ik langs den weg der gisting, volgens BRINKMAN (\*), van *Slym*, *Lympha* en *Serum* een zetsel en andere verscheinfelen zag ontstaan, welke scheenen met den waaren Etter overeen te komen en niet zelden Slijmziekten zag overgaan in waare Etterings ziekten: de proeven van DARWIN en HOME, versterkten mij verder in mijne meening; dan SALMUTH, en laater BRUGMAN en eindelijk GRASMEYER overtuigden mij zeer duidelijk van het onrichtige en onvoldoende mijner gevolgtrekkingen en daar op gebouwde Theorie. Ik bevond in de daad, dat geen herstellende of waare Etter zonder eene verhoogde Levenskracht of Ontsteeking kan voortgebracht worden. Dan, mijne Waarneemingen en die van anderen overweegende, hoe naamelijk soms gevallen voorkomen, waar wij eene stoffe vinden, den besten Etter gelijkende en evenwel daarbij geene verhoogde, maar in tegendeel eene verminderde, Levenskracht waarnamen; ontstonden er al weder twijfelingen, die ik niet kon oplossen, noch bij anderen opgelost kon vinden. Hier bleef mij dus overig te onder-

(\*) Beytrage zu einer neuen Theorie der Gährungen, (Dusfeldorf 1789.)

derzoeken, of die stoffe eene waare Etter was of niet? Ik herhaalde dus de proefneemingen en waande door eene *Chemische Analyse* dit te zullen ontdekken. Maar hoe veele hulpmiddelen ontbraken mij hieraan! Weldra bespeurde ik mijne daartoe te geringe kennis, terwijl ik van *Konstvrienden* verwijderd was, die mij hierin behulpzaam konden zijn — en de tijd mij ook ontbrak, om alles naar behooren te verrichten.

Eindelijk bevond ik, bij alle de proefneemingen van verscheiden jaaren herwaards, de ijdelheid der poogingen, om door *Chemische* proeven dit geheim der Natuur te willen ontdekken; en dus wierd ik overtuigd van het gezegde van den grooten HUFELAND, in zijne voortreffelijke *Verhandeling, über die Natur, Erkenntnismittel und Heilart der Skrofelkrankheit 5<sup>de</sup> Kap.* „ Dem Chemi-  
„ ker kommt es blos auf die todte chemi-  
„ sche Natur der sache an, und er braucht  
„ sich also dazu auch blos todter Reagen-  
„ tien zu bedienen. Aber bei dem Arzt  
„ ist der Fall ganz anders; diesem ist eine  
„ solche Untersuchung nicht hinreichend,  
„ und zwar hier im Betreff der Krankheits-  
„ stoffe aus folgenden Gründen:



„ 1. Dem Arzt kommt alles darauf an zu  
„ wissen, wie verhält sich dieser oder jener  
„ Krankheitsstoff, dieses oder jenes Mittel  
„ zur lebendigen Natur. — Diefs ist feine  
„ Welt, in der er wirkt, nicht die todte. —  
„ Folglich muß er feine Versuche nicht mit  
„ todtten Reagentien (weil ihm diese nur das  
„ Verhältniß der Sache zur todten Welt zei-  
„ gen), sondern mit lebendigen Reagentien,  
„ und zwar mit dem lebendigen menschlichen  
„ Körper anstellen. — Was giebt uns die  
„ allergenauſte Unterſuchung eines Arzneij-  
„ mittels für Aufſchlüſſe in Abſicht der Wir-  
„ kung auf die lebendige organiſche Na-  
„ tur? — Keine, oder höchſtens analo-  
„ giſche Wahrſcheinlichkeit. Noch Niemand  
„ hatt daraus *a priori* die Wirkung auf das  
„ Lebende beſtimmen können; denn dieſs  
„ iſt ja eine ganz andere Welt, wo ganz  
„ andere Geſetze, ganz andere Verhältniſſe  
„ ſtatt finden. — Eben ſo iſt es mit den  
„ chemiſchen Analyſen der Krankheitsſtoffe.  
„ Man konnte ſie ſo vollſtändig wie möglich  
„ haben, und dennoch wiſſen wir daraus  
„ noch nichts von der Wirkungsart auf die  
„ lebendige Natur. — Die einzige Ana-  
„ lyſis der Mittel und Krankheitsſtoffe, die  
„ dem

„ dem practischen Arzt brauchbar ist, ist  
 „ die Analysis, durch das Reagens des  
 „ menschlichen lebenden Körpers.

„ 2. Wenn auch wirklich die chemische  
 „ Analysis Nutzen hätte, so läßt sie sich ja  
 „ nie so mit Krankheitsstoffen anstellen,  
 „ daß man reine Resultate erhielte. Denn  
 „ wo ist ein vollkommen rein dargestellter  
 „ Krankheitsstoff? Wollte man glauben, daß  
 „ es etwa das Eiter eines Skrofelgeschwürs  
 „ oder die ausfließende *Lympe* wäre, so  
 „ würde man sehr irren. Ohnstreitig ist zwar  
 „ Skrofelschärfe dabei, aber diese ist mit  
 „ so viel andern Bestandtheilen vermischt,  
 „ daß es flechterdings unmöglich seyn wird,  
 „ zu bestimmen, was immer bei den Er-  
 „ scheinungen auf Rechnung des Skrofelgifts  
 „ oder der verschiedenen Beimischungen.  
 „ Eben das gilt vom Tripper ausfluß,  
 „ Schankermaterie, Blattermaterie. Man  
 „ darf ja nicht glauben, daß man reines Ve-  
 „ nerisches oder Blatterngift habe. Man kan  
 „ durch Hitze den Blatternstoff verjagen, die  
 „ Materie bleibt.”

„ 3. Eine solche Materie, ausserhalb dem  
 „ Körper zu versuchen angewendet, ist ja  
 „ nicht mehr dieselbe, die sie in dem Körper  
 „ war, und erlaubt also keine Schlusse von



„ ihren nunmehrigen Verhalten auf das im lebendigen Körper. — Sobald ein solches Fluidum ausser dem Einfluß der Vitalität gesetzt werd, gehorcht es andern Gesetzen, und giebt andere Resultate, als in dem lebenden Körper.”

Wat nu verschaffen niet deeze Proefneemingen? niet alleen bewijzen dezelve dat, zodra de vogten van den invloed der levenskracht beroofd zijn, terstond de chemische werking de overhand krijgt, en dat zij soms schielijk, soms langzaam, naar haare bijzondere natuur of bijgekomen gisting, veranderd en ontbonden worden: maar daar te boven bevestigen ook onze proeven de uitkomst van GRASMEYER, om namelijk door zijn proefmiddel den waaren etter van den onwaaren te onderkennen.

En dewijl ik van dit proefmiddel reeds gewag gemaakt heb, en verder bij mijne proefneemingen maaken zal, acht ik het nodig om hetzelfde volgens de aanwijzing van den geachten schrijver van de *Abhandlung vom Eiter und den Mitteln ihn von allen ihn ähnlichen Feuchtigkeiten zu unterscheiden*, Göttingen 1790, hier te plaatsen. Dan dit Onderwerp mij zeer belangrijk voorkomende, meen ik veelen mijner Nederduitsche konstbroederen geen on-

dienst

dienst te doen, met de geheele tweede afdeeling dier verhandeling in 't nederduitsch over te brengen, welke bevat: *Hoe zich de waare Etter van alle dierlijke, gezonde en zieke, vogten laat onderscheiden.*

Zuivere etter — zegt hij — die in een Absces is bereid geworden, is zeer gemakkelijk te kennen; dezelve is een geelagtig wit vogt, bijna van de dikte als de honig, iets kleverig, hij heeft geen reuk en, zo als sommige verzekeren, ook geen smaak; hij zinkt in het water, maar vermengt zich bij het omroeren met het zelve en maakt het troebel en melkagtig, en als dit mengfel eenigen tijd gestaan heeft, bezinkt het weder, en heeft nu meerder dan minder vezelen of vlokken, naar maate de etter meer of min rijp is: dezelve is alleen het voortbrengfel der levendige, doch zieke natuur, en geene konst heeft ooit een waaren etter buiten het levendig dierlijk lighaam kunnen bereiden.

Indien 'er nu eene zichtbaare Ontsteeking in eenig deel is voorafgegaan, welke zich niet verdeeld heeft, maar in een rondagtig verheven gezwel is overgegaan, 't welk een vogt bevat, 't geen, nadat het gezwel, of van zelf of door de konst, is geopend geworden, met het beschreeven vogt meer of min gelijk-



heid heeft; zo is niets gemakkelijker, dan dit voor etter te verklaaren.

Maar niet altoos zijn de ontsteekingen, die de verettering voorafgaan, zo blijkbaar geweest, gelijk bij de inwendige ontsteeking niet zelden het geval is, en dikwijls vertoont zich een golvend gezwel, 't welk in ééne nacht is ontstaan, en bij het openen eene stoffe bevat, die den etter, volgens aanzien, volkomen gelijk is. Verder is de etter dikwijls zodanig vermengd, dat alle uitwendige tekenen niet toereikende zijn, om te bepaalen, of men zulke mengfels voor etteragtig moet houden dan niet?

Het is dus wel der moeite waardig, naar een teken omtezien, 't welk ons bij deeze stoffe eenig licht verschaft; dan, men herhaale alle de proefneemingen van CULLEN, BRUGMANS, DARWIN enz. en men zal bevinden, dat dezelve slechts ten deele iets aanwijzen; doch dat dezelve ons daar, waar het vogt tegenstrijdig en waar juist een vast en zeker kenteken noodwendig is, tot ons groot verdriet, in onzekerheid laaten. Dan ik moet tot mijne verwondering bekennen, dat ik bijna niet kan begrijpen, dat men dit kenteken, 't welk ik aanstonds zal beschrijven, niet eerder heeft gevonden, te meer, dewijl dit middel toch  
aan

aan allen proefneemeren is bekend geweest. Dit had mij ook, toen ik de in het oogvallende proef het eerste maal zag, zo wantrouwend gemaakt, dat ik een groot aantal proeven, en wel onder zeer onderscheiden omstandigheden, te vooren heb genomen, eer ik het nog waagen durfde mij zelven te zeggen: dit is een kenteken, 't welk den etter voor altoos aanwijst.

Dan daar ik nu zag, dat onder alle mengfelen, waarbij etter tegenwoordig was, dit verschijnsel zich telkens, en daar, waar geen etter aanwezig was, zich nooit vertoonde; zo meen ik nu volkomen recht te hebben, op deeze handelwijze, die den etter zeker ontdekt, geheel te kunnen vertrouwen.

Het middel, van 't welk ik nu gebruik maak, is het *Oleum Tartari per deliquium*, en de behandeling is de volgende.

Wanneer ik zuiveren etter heb, verdun ik denzelven altoos met bijna twaalfmaal zo veel water en wel, liefst regenwater, om dat het gedestilleerde water te duur en het put of bronwater door meerder of minder aarddeelen, onzuiver is. Dit water moet lauw zijn en den 100sten graad *v. Fahrenh.* niet overtreffen. Na dat ik nu het water en den etter nauwkeurig onder elkanderen gemengd



mengd heb, giet ik eerst van het *Ol. Tart. p. d.* omtrent zo veel daarbij, als de hoeveelheid des etters bedraagt (maar zo nauwkeurig was ik evenwel nooit) en vaar voort, alles met een stokje, zo schielijk mogelijk, onder elkanderen te vermengen, omtrent op de zelfde wijze, als men het wit van een eij tot schuim klopt; hier na duurt het niet lange, of het gantsche mengsel wordt in een Gelei veranderd, met het welk men, gelijk met het wit van een eij, lange en dikke draaden kan trekken, en die, wanneer de etter goed was, taaier wierd en zich schielijker vormde; doch indien de etter slechter was, wierd het Gelei niet te samenhangende en vormde zich laater.

Goede etter vormt dit Gelei, wanneer men nauwlijks het *Ol. Tart. p. d.* daar heeft bijgegoeten: maar zelfs de slechtste vertoont zich bij de proefneeming reeds binnen een half uur zo sterk, dat men hem niet kan miskennen; als zich nu dit Gelei binnen een half uur niet gevormd heeft, dan laat ik het mengsel staan, wanneer een half uur daarna het Gelei zeker geboren is.

Met koud water gelukt de proef ook altoos, maar niet zo schielijk; evenwel heb ik ook met koud water dunne etter binnen een half uur dit Gelei zien vormen. In plaats van regen-

genwater heb ik ook al dikwijls zuiver bronwater genomen; dan het is altoos zekerer, regenwater, of als men wil een gedestilleerd water, te neemen.

Deeze zo eenvoudige en gemakkelijke proef is het, waar door de etter altijd ontdekt word en dit zal ik door volgende proefneemingen bewijzen.

Vooraf echter moet ik nog ééne aanmerking maaken. Is de etter zeer dun, dat is, zinkt dezelve stilstaande slechts weinig naar den grond, terwijl het bovenste zo veel helderer word, ('t welk alleen *Serum* is), dan moet men 'er minder water vooraf bijmengen; want dewijl het geen, 't welk met *Ol. Tart per del.* de Gelei maakt, het zwaarste gedeelte des etters is, 't welk neerzinkt, zo moet dit de hoeveelheid van het bijtegieten water bepalen. Maar, daar nu een geoëffend oog wel dra kan zien, welke etter dun is, zonder vooraf zich van het bezinkfel te overtuigen; zo zal een ieder, die deeze proef neemt, de hoeveelheid van het water gemakkelijk kunnen vinden. Dit moet men ook in acht neemen, als men, in plaats van werkelijk vloeibaaren etter, met zodanige zich moet vergenoegen, welke in het plukzel is ingezoogen; de dikke etter hangt aan hetzelfde, of is nog gedeeltelijk  
in



in de Absces. Wanneer de etter met slijm is vereenigd, moet men zorgvuldig het water met het vogt, 't welk men onderzoeken wil, vermengen, en niet eerder het *Ol. Tart. p. d.* 'er mede vermengen, voor dat alles zo goed mogelijk gemengd is.

Ook kan men den taaften slijm, als men 'er slechts eenige handeling van heeft, in één minuut genoegzaam met water vermengd hebben. Deeze Gelei blijft onveranderd, schoon zij ook 4 weken en langer blijft staan; zij is zelfs veel meer doorschijnend, dan het mengfel was, voor dat het *Ol. Tart. p. d.* 'er bij gevoegd wierd; 'er bezinkt niets, of in eenige uitzonderingen slechts weinig; en zelfs de ondoorschijnende vlokken, welke in den met water verdunden etter drijven, worden helderer; de geheele Gelei, als 'er geen bloed met den etter is vermengd geweest, heeft de gedaante van grijs doorschijnend hoorn. Met één woord, het is eene zo in het oog vallende verandering, dat het gantsch overtollig is, dezelve verder te beschrijven: een ieder die mijne proeven neemt, zal terstond overtuigd worden, dat hij, die dezelve slechts eens genomen heeft, niet meer kan mistasten.

Maar dit is vooral nodig, dat alles vooraf wel door elkanderen vermengd worde, voor dat

dat het *Ol. Tart.* 'er bij gevoegd worde, als de proef wel gelukken zal.

Ik heb ook *Sal Tart.* in water opgelost, tot deeze proeven genomen; maar dan heb ik de Gelei nooit zo taai bekomen, als met *Ol. Tart. p. d.* Ik nam ook de proef met de gemeene *Zeepsieders loog*; 'er ontstond een Gelei, indien de Etter zeer goed was. Met zuivere *Caustieke loog* deed ik latere proefneemingen; het is waar, de Gelei vormde zich spoediger en wierd over 't geheel taaier; maar als ik dezelve liet stilstaan, zonderden zich alle de bestanddeelen af; het dikste deel bezonk en het dunnere deel dreef boven op; dit deed nimmer de Gelei, welke ik door *Ol. Tartari* verkreeg; want als ik dezelve liet stilstaan, bleef ze na 4 weeken even zo als toen zij ontstond. In gevalle men met etter uit de Long proeven neemen wil, als dezelve nog met zeer veel gezonden slijm vermengd is, namelijk in 't begin der ziekte, zoude ik eene *Caustieke loog* aanraaden, want mij dunkt, dat in dit mengsel zich de etter door een taaier Gelei veraad. Ik heb ook nimmer reden gehad, om naar een beter proefmiddel om te zien, want dit heeft mij altoos voldaan; ja ik kan zeggen dat ik door hetzelfde altoos den dag konde bepaalen, wanneer 'er eene chronische long-ont-



ontsteeking tot verettering overging, gelijk dit de 31 en 34ste proefneem. bewijst. Trouwens meer kan men toch niet verlangen.

Als ik nu deeze op zulk eene wijze gevormde Gelei in een ander glas, met water gevuld, overgiet, vermengt zij zich niet met het zelve, maar vertoont zich als eene wolk op zich zelve, die in het water nederzinkt. Indien ik echter door sterk en aanhoudend omroeren, den samenhang deezer wolk scheide, ontstaat 'er eene menigte vlokken, welke alle kort daar na weder in het water nederzinken, het water word met het loogzout verzadigd en word dan meer of min troebel, naar mate hetzelve door aardagtige bestanddeelen meer of min onzuiver was; neemt men dus gedestilleerd water, zo geschied dit gevolgljk niet.

Ik waag het niet de wijze, waarop deeze bijzondere Gelei ontstaat, te verklaaren. Indien het grondbestanddeel in den etter vet ware, dan zoude 'er eene zeep geboren worden, welke zich met het water liet vermengen; maar hier geschied het tegendeel. Dan misfchien geeft het loogzout aan de *Lympha*, die door de verettering veranderd en als het ware gesmolten, haare oorspronglijke natuur, namelijk haare stremmende eigenschap we-

weder, en misfchien heeft in den etter het phosphorzuur, 't welk aan de dierlijke ligchaamen eigen is, de overhand, en word door het loogzout verzadigd; zeer waarschijnlijk is in den etter een zuur verborgen, 't welk, wanneer dezelve eenigen tijd buiten het ligchaam geweest en tot verrotting overgegaan is, blijkbaar word. Men vergelijke hiermede BRUGMANS *Disf. de Puogenia.* p. 17.

Ik vertrouw mij niet toe, dit verder te verklaren, te minder, dewijl chemische en mathematifche toepasfingen op de verrichtingen van het dierlijk leevend ligchaam meestendeels zeer gedwongen en onnatuurlijk zijn, en tot dusverre, als men de waarheid zeggen zal, nog niet veel op heldering gegeven hebben.

### *Eerste Proefneeming.*

Ik verzamelde in een glas 2 Oncen van de des morgens opgehoeste geelgroene dikke fluimen, door eenen Lijder, welke reeds 2 maanden lang aan Rheumatismus lag. Het glas wierd met eene blaas toegebonden en in de lucht, buiten de zon gesteld, zijnde toen de warmte van 60 tot 70 gr. Fahr. In de eerste 4 dagen bleef de stoffe zonder de minste verandering; den 5<sup>den</sup> reezen er eenige lucht-

G

bel-



belletjes op, welke allengs vermeerderden en de blaas eenigzins deeden opspannen. De blaas den 7<sup>den</sup> dag doorgestoken zijnde, kwam 'er een vunzige, zuur stinkende, lucht uit. De stof was meer opgereezen en losser, overdekt met een teder en glinsterend vliesje; het vogt was van boven dun en melkagtig, in 't midden vertoonde zich eene meer van eengescheiden, aschgrauwe, wolagtige stoffe. Dit alles weder in eene nieuwe blaas besloten zijnde, was de slijm den 9<sup>den</sup> dag meer opgereezen en meer wolagtig; op den bodem was eenig zetsel van bleekgeele roomagtige deeltjes: Den 12<sup>den</sup> het zetsel vermeerderd; in 't midden was de slijm zeer los en draadagtig; terwijl 'er meer geelgroen water op stond: den 14<sup>den</sup> dag wierd de blaas doorgestoken, waar uit een scherpe meer stinkende lucht kwam, welke meer naar zwavellucht geleek. Het dunne vogt was helder en groengeel; In 't midden veele wolken, als los katoen. Op den grond was het zetsel onderscheiden: het onderste iets geeler, dan het bovenste. Het glinsterend vliesje 'er afgenomen en het bleekgroene water zorgvuldig afgegoten hebbende, ging 'er toch van het zetsel iets mede over 't welk het water melkagtig maakte, maar kort daarna zakte; vervolgens dit vogt gefiltreerd heb-

hebbende, bleven 'er eenige slijmige deeltjes op het Filtreer papier te rug.

Het helder geelgroen vogt maakte met het Vitrioolzuur geene opbruifching; 'er reeseen scherpe lucht in de oogen en neus. Op den grond lag een zagt, donfig, geelwit zetsel. Het zetsel in het eerste glas geleeek naar den besten etter, ontbond zich zeer ligt in het regenwater, maar zakte straks weder. Een gedeelte van dit zetsel met het proefmiddel van *Grasmeyer* beproevende, veranderde eerst na een uur in eene weinig taaje en meer draadagtige stoffe. Het onderste zetsel behield zijnen stank nog eenige dagen lang, wanneer dezelve allengs verminderde.

Een gedeelte hiervan gedroogd zijnde, ging tot eene zagte, grauwtige meelstoffs over. Het tweede gedeelte van het zetsel in zuiver regenwater ontbonden zijnde, en eenige dropelen sterk vitrioolzuur daarbij gedaan hebbende, veranderde het water in een blauw melkagtig vogt, waarin een korrelijg en iets geelrood zetsel ontstond.

### *Tweede Proefneeming.*

Vier Oncen zuivere, taaje, heldere, opgehoeste slijm in een glas in den voorg. graad van

G 2

warm-



warmte geplaatst, bleef 9 dagen lang onveranderd; maar van nu af aan bemerkte ik de vunzige zuure lucht, als oude kaas, door de doorgestoken blaas. De slijm wierd nu losser en wolagtiger; tusschen de dikste stoffe was een kleverig water, iets melkagtig. Den 12<sup>den</sup> dag was de nieuwe blaas op het glas zeer uitgezet; dezelve doorgestoken zijnde, was de reuk sterker en scherper in de oogen en neus; de slijm meer ontbonden: op den grond lagen eenige geelwitte deeltjes; den 20<sup>sten</sup> dag was de slijm als losse vlokken in een groenagtig troebel water drijvende; het zetsel was in grooter menigte, donsagtig en bleekgeel; daaronder vertoonde zich een meer roomagtig zetsel. Dit met warm regenwater geroerd, zo veel mogelijk ontbonden en voorts *Ol. Tart. p. d.* er bijgedaan zijnde, veranderde hetzelfde in den tijd van 12 minuten in een maatic taaje Gelei; 't welk ondoorschijnend was. Dit zetsel in de open lucht eenige dagen gestaan hebbende, ontliet zich allengs en wierd vloeibaarer. Op den grond lagen weder roomagtige deeltjes.

Op een ander gedeelte van dit water eenige droppelen *Spiritus Salis Ammon. Caust.* bijgegoten zijnde, wierd het zelve terstond blauwagtig en sterk schuimende na eenig roeren; en

we-

weder in rust gestaan hebbende, zakten allengs slijmagtige of meer lilagtige deeltjes naar den grond. Het glas wierd omvergestooten, waardoor ik de proefneeming niet kon vervolgen.

*Derde Proefneeming.*

Twee Oncen *Serum* uit het Hartzakje van Kalveren in een toegebonden glas, in de lucht-warmte van 60 tot 70 gr. Fahr. gesteld, bleef 4 dagen onveranderd; den 5<sup>den</sup> dag de blaas doorgestoken zijnde, rook het vogt zuuragtig. Dezelve weder toegebonden en nog 4 dagen gestaan hebbende, was de reuk bij het openmaaken meer rotagtig. Op den bodem van het glas lagen eenige kleine bleekgeele deeltjes. Den 16<sup>den</sup> dag was de stank erger, iets bijtende in de oogen en neus, het zetsel meer roomagtig, waar op een roodgeel, iets kleverig water dreef.

Van dag tot dag nam nu het zetsel toe; het water wierd helderer en minder kleverig. Den 20<sup>sten</sup> dag het water afgegoten en gefiltreerd hebbende, bruischte het eenigzins met het Vitrioolzuur op en wierd meer groengeel. Het zetsel geleek den besten etter; ontbond zich in regenwater en maakte hetzelfde melkagtig,



maar zakte straks weder. Een gedeelte van dit zetsel met warm water geroerd en het *Ol. Tart p. d.* 'er bijgedaan hebbende, wierd hetzelfde wel iets dikker, maar veranderde geenzins in een Gelei. Een ander gedeelte van dit zetsel, met Vitrioolzuur vermengd, wierd vlok-kig, of veel meer korrelagtig en zakte weldra weder. Een gedeelte van het zuiver zetsel gedroogd zijnde had de gedaante van eene zachte bleekgeele meelstofte, zonder eenigen reuk of smaak.

#### *Vierde Proefneeming.*

Ten zelfden tijde twee Oncen *Serum* van Kalveren met een half drachma zuiveren etter uit een ettergezwel in een toegebonden glas op denzelfden graad van warmte geplaatst zijnde, gaf dit mengsel reeds den 3<sup>den</sup> dag een vunzigen zuuragtigen reuk van zich en kleurde het lakmoespapier eenigzins rood: den 5<sup>den</sup> dag was de reuk meer rotagtig; den 9<sup>den</sup> dag een groot gedeelte aan etter gelijkvormig. Van boven een geelgroen, iets troebel, water; het zetsel nam van dag tot dag toe.

Het daar afgegoten water wierd niets veranderd door het Vitrioolzuur, noch veranderde ook zelve het lakmoes tinctuur,

Het

Het zetfel geleele den besten etter en stonk iets rotagtig, mengde zich volkomen met regenwater, doch zakte weder spoedig, terwijl het water helder bleef. De helft van dit zetfel met het *Grasmeijersche* proefmiddel beproevende, maakte dit na 6 minuten roerens een maatig taai Gelei. De andere helft wierd, op een filtrum gedroogd zijnde, eene fijne bleekgeele meelstof, welke in warm regenwater ontbonden wordende hetzelfde iets melkagtig maakte: deeze stof weder gezakt zijnde wierd door het *Ol. Tart. p. d.* niet veranderd in een Gelei; doch wierd daar door slegts iets dikker en ondoorschijnende, even als weeke gekookte stijffel.

#### *Vijfde Proefneeming.*

Eene Once dunne, met kaazige brokjes doormengden, etter, uit de zweerende borst van eene zwakke kraamvrouw, in een toegebonden glas bewaard in de warmte van 50 tot 60 gr. Fahr. maakte in de eerste 4 dagen geen merklijke verandering; vervolgens wierden de kaasagtige brokjes allengs losser en iets geeler; het boven drijvende water was nog iets troebel, op den grond vormde zich een roomagtig zetfel. De blaas doorgestoken



zijnde, rees 'er een zuure lucht uit derzelver opening. Het water afgegoten en eenige drop-pelen Vitrioolzuur 'er bijgedaan zijnde, wierd het vogt iets melkagtig; na eenige minuten waren veele kaazige brokjes gezonken. Op het eerste zetsel zuiver warm regenwater bijgegoten zijnde, wierd hetzelfde ontbonden, het water dik, melkagtig en daar na ontstond weder een zetsel als room. Dit zetsel maakte met het proefmiddel eerst na 12 minuten roerens een gering Gelei.

#### *Zesde Proefneeming.*

Eene Once meer dikken etter, uit dezelfde borst, 7 dagen later, na dat de krachten van de lijderes door het gebruik van goede voedfels en *Kina* veel toegenomen waren, maakte met het proefmiddel in den tijd van 4 minuten een taai en helder Gelei: maar  $1\frac{1}{2}$  Once van denzelfden etter, in een glas bewaard zijnde en 7 dagen lang in de warmte van 60 tot 70 gr. F. gestaan hebbende, stonk zeer rotagtig en maakte met het proefmiddel met veele moeite een zeer gering Gelei.

*Zevende Proefneeming.*

Ik goot twee Oncen zuiver zog van eene gezonde sterke Vrouw en één drachma zuiveren etter, uiteene zweerende Okfelklier, in een toegebonden glas en plaatste dit in eene warmte van 60 tot 70 gr. Fahr. Het zog vermengde zich zeer moeilijk met den etter en scheidde zich terstond weder van denzelven. Na dat dit mengsel 3 dagen gestaan had, was het zog gehot, de weij bleekgeel, in welke veele losse vlokken dreeven. De etter lag nog onveranderd op den grond. Den 5<sup>den</sup> dag de blaas doorgestoken hebbende, kwam 'er een zuure lucht uit de opening en het met lakmoes tinctuur geverwd papier op dezelve gehouden wierd iets roodagtig. Veele wolagtige vlokken en kaasbrokjes lagen op den etter. Den 12<sup>den</sup> dag waren deeze meest alle ontbonden, de wei groengeel en iets troebel; de stank iets rotagtig. Den 15<sup>den</sup> dag was de weij helderer en een meer roomagtig zetsel op den daaronder liggenden etter. De weij in een ander glas overgegoten zijnde behield nog 5 dagen haar rotagtigen stank, wanneer dezelve, het glas open gestaan hebbende, allengs verdween, terwijl nog gestadig kleine vlokken naar den grond zakten. De eerste weij met vitri-



oolzuur beproefd gaf weinig blijken van opbruifching; 'er reezen eenige luchtbelletjes op; het water wierd iets groener. Een gedeelte van het zetsel, met warm regenwater vermengd, wierd terstond troebel en ontbonden; fchielijk kwam er weder een zetsel, den besten etter gelijkende, op den grond: 't welk met het proefmiddel in korten tijd een afchgrauw en taai Gelei vormde.

### *Agtste Proefneeming.*

Voorts nam ik tot een proef twee Oncen dunne melkagtige en kaazige stoffe, van eene Vrouw, die reeds 14 dagen na de verlossing eene zog verplaatzing in de liesch en dije gekregen had. Haare borsten waren in 't begin vol van zog geweest, wel gezogen door het kind, tot dat 'er na eene hevige ergernis eene koorts volgde, waarbij het zog in de borsten fchielijk verminderde; eerst 4 dagen daarna kreeg zij hevige spannende pijnen in de heup, liesch en dije; de lieschklieren zwollen zeer, doch bleeven zonder ontsteeking. De zwelling bleef maatig gespannen, welke week geworden zijnde geopend wierd. De dus verkregene stoffe in een toegebonden glas bewaard en in de luchtwarmte van 50 tot 60 gr. F.  
ge-

gesteld zijnde, zakten den eersten dag reeds veele kaazige brokjes op den grond. De weij was troebel en bleekgeel; ieder dag nam het zetfel toe, wordende het onderste meer roomagtig. Den 7<sup>den</sup> dag de blaas doorgestoken hebbende, kwam 'er eene zuuragtige lucht uit, als oude zuure melk. Het bovenste zetfel was als katoen op het dikker roomagtige zetfel drijvende. Nog 4 dagen gestaan hebbende, wierd het bovenstaande water helderer, iets kleverig aan de vingeren. Het zetfel maakte met het proefmiddel een zeer gering Gelei.

#### *Negende Proefneeming.*

Twee Oncen van dezelfde stoffe wierden, een na haare ontlasting, met het proefmiddel niet in Gelei veranderd, welke moeite ik ook deed. Slegts wierd deeze stoffe, na 16 minuten in rust gestaan te hebben, iets taajer. Op den grond lagen nog veele niet ontbonden kaazige brokjes.

#### *Tiende Proefneeming.*

Vervolgens nam ik twee Oncen dunne melkagtige stoffe, van eene Vrouw, welke 3 weken na haare verlossing en na vermin-

de



dering van het zog in de borsten, hevige, omzwervende pijnen geleden en eindelijk zwelling in de liesch en dije gekreegen had, welke de Arts met wasfchingen en purgeermiddelen getracht had te verdrijven, doch ten laaftten, na verloop van 6 weeken, op mijn aanraaden geopend wierd. Deeze stoffe veranderde door het proefmiddel niet in Gelei. Ik liet de ten uiterften verzwakte lijderes de *Kina* en andere versterkende middelen gebruiken. Terwijl dus de krachten van dag tot dag vermeerderden, nam ik verder van tijd tot tijd de proef met de nog ontlastwordende stoffe uit de gemaakte opening en bespeurde duidelijk, dat, naar maate de krachten toenamen, de stoffe met het proefmiddel taajer wierd, hoewel dezelve nooit tot een goed en waar Gelei overging.

#### *Elfde Proefneeming.*

Van een scrofuleufen Jongeling, van 13 jaaren, die eenige opengebroke klieren aan den hals had, verzamelde ik omtrent 3 drachmen slijmigen geelen etter. Deeze leverde, welke moeite ik ook aanwendde, door het proefmiddel geen Gelei uit. De zweerende klieren met eene dunne *Solut. Terræ pond. mur.* eenige

ge

ge dagen bevogtigd en inwendig van dezelve daags 3 maal 20 droppelen gebruikt zijnde, ontdekte ik dat de klieren eenigzins ontstoken waren; de ontlaste etter wierd nu dikker, minder slijmig en veranderde met het proefmiddel in een maatig taai Gelei. Vervolgens voegde ik de *Kina* bij het voorgaande middel, waarop de etter allengs dikker en taaier wierd met het proefmiddel, naar maate de genezing vorderde, welke ook weldra volkomen was.

Hetzelfde verschijnsel hebben meerdere proefneemingen met den scrofuleusen etter opgeleverd. Doch, waar tevens beenbederf plaats had, was 'er nooit rechte Gelei te krijgen.

#### *Twaalfde Proefneeming.*

Twee Oncen dikke, geele en stinkende fluimen van eenen aan de Longteering liggenden Lijder, in een glas bewaard, wierden licht in regenwater ontbonden, hoewel echter veele slijmdraaden daar in dreeven. Schielijk zakte een gedeelte naar den grond, 't welk den besten etter geleeke. Ik nam de proef met dit zetsel door het proefmiddel, en weldra ontstond een zeer schoon helder Gelei.

Met



Met het Vitrioolzuur bespeurde ik geene opbruifching; maar het zetsel wierd korrelig en draadagtig. Het afgegoten water van het zetsel was bleek geelgroen en veranderde de lakmoestinctuur weinig of niet. Op het filtrum bleeven nog veele slijmdraaden terug.

### *Dertiende Proefneeming.*

Bij denzelfden Lijder ontstond boven aan de heup een ettergezwel, 't welk van zelve open gebroken zijnde, een dunnen, bloedigen en zeer stinkenden etter ontlastte.

Hiervan ééne Once in een toegebonden glas 2 dagen in de open lucht (zijnde toen de warmte van 64 tot 72 gr. F.) gestaan hebbende, zakte een roodagtig zetsel naar den grond. Het daar op staande water was bleekrood. De blaas wierd niet uitgezet door lucht; bij het doorsteeken der blaas kwam er een zeer rotagtige lucht uit: een met lakmoes geverwd papier op de opening der blaas gelegd veranderde niets, doch het met zuur rood gemaakte lakmoespapier wierd hier door eenigzins blauw gekleurd. Het zetsel was meer oranjekleurig; ontbond zich in regenwater volkomen. Een klein gedeelte van het zetsel veranderde door het  
proef-

proefmiddel min of meer in Gelei, na dat het 12 minuten omgeroerd was en meer dan een uur in rust gestaan had. Het ander gedeelte van het zetsel wierd door het bijgevoegd vitrioolzuur bleekgeel en brokkelig of korrelig.

#### *Veertiende Proefneeming.*

Van een anderen aan scrofuleuse Longteering liggenden Lijder nam ik ongeveer ééne Once opgehoesten slijm en bewaarde dezelve in een glas: deeze bleef 7 dagen zonder eenig blijk van verandering. Door de doorgestoken blaas kwam een muffe stank: na dat de slijm verder nog 6 dagen lang in een toegesloten glas gestaan had, scheidden 'er zich allengs meer waterdeelen; de slijm wierd meer ontbonden en donsagtig; van dag tot dag zakten nu de ontbonden deeltjes op den grond, maakende een schoon roomagtig zetsel: de stoffe stonk nu als rottige vis. Het zetsel veranderde door het proefmiddel in een zeer dun Gelei.

#### *Vijftiende Proefneeming.*

Eéne Once slijm van denzelfden lijder vermengd



mengd met 1 drachme van de etteragtige fluimen des lijders, van welke ik in de twaalfde proef melding maakte, in een toegebonden flesje 4 dagen gestaan hebbende, was 'er weinig meer van de slijm te kennen. Het zetsel was zeer vermeerderd. De blaas doorgestoken zijnde liet een stank uit als van rottende vis, het wateragtige deel was troebel en vol vlokken. Deeze vlokken, die eerst katoenagtig waren, zakten allengs naar den grond en wierden den etter gelijk. Het water wierd helderer en van eene geelgroene kleur en stonk zeer als rottende vis; het lakmoespapier met dit water bevochtigd wierd iets roodagtig. Het zetsel nog 7 dagen gestaan hebbende, veranderde door het proefmiddel, met zeer veele moeite en eerst na verloop van 12 uren, in een maatig taai Gelei.

#### *Zestiende Proefneeming.*

Bij denzelfden Lijder was ook de glandula axillaris zeer gezwollen en pijnlijk, welke voorts geopend zijnde een taaien geelen etter opleverde, die een rottende vis stank van zich gaf. Deeze etter veranderde door het proefmiddel in den tijd van 3 minuten in een helder en maatig taai Gelei.

*Ze-*

*Zeventiende Proefneeming.*

Ter zelve tijd gelegenheid gevonden hebbende, om de Ontsteekingskorst, welke niet zeer taai of lederagtig, maar zeer bros en dun was, van eenen zwakken lijder, die toen aan eene rheumatieke Longontsteeking lag, te beproeven, plaatste ik 2 drachmen van de ontsteekingskorst in een glas en bedekte denzelven geheel met den etter der voorg. proefneeming. Het glas met eene blaas wel gesloten zijnde stelde ik in de lucht-warmte van 60 tot 70 gr. Fahr. Na 6 dagen liet ik er den etter afloopen en bevond de ontsteekingskorst reeds op de helft verminderd; het overige was zeer los aan elkanderen hangende. Ik deed er den afgegoten etter weder bij en liet dit mengsel nog 6 dagen samen staan, waar na de korst geheel ontbonden was. Nadat ik er regenwater bij gegooten had, mengde zich alles gelijkvormig, in de gedaante als melk; maar straks zakte het dierlijk vogt weder en veranderde door het proefmiddel in een schoon, helder en taai Gelei.



*Aanmerkingen en Gevolgtrekkingen.*

Ik zal hier mede deeze proefneemingen eindigen, dewijl de overige veelal op hetzelfde uitkomen en ook van de Heeren BRUGMANS en GRASMEIJER reeds gemaakt zijn; zodat ik nu slechts eenige aanmerkingen en gevolgtrekkingen hier bij zal voegen.

Wij zien voor eerst uit deeze proeven met het serum en slijm, dat deeze vogten soms langen tijd zonder eenige zichtbaare verandering kunnen blijven, tot dat zij eindelijk in eene zuure en vervolgens in eene rotte gisting overgaan, dat zij dan een zetsel maaken, veel met den waaren etter overéénkomende, uitgezonderd, dat zij in een taai en doorschijnend Gelei door het proefmiddel veranderd worden.

Wij zien teffens de groote verwandschap deezer stoffen met den etter, dewijl dezelve, slechts met een klein gedeelte hier van vermengd, de eigenschappen van etter aanneemen. Dus werkt dan de etter als een ferment, van het welk slechts een gering gedeelte nodig is, om de aanverwande vogten, vooral de *Lympha* (het voornaamste bestanddeel des etters) aan zich gelijkaartig te maaken.

Wij zien verder, dat 'er nog iets bij den  
waa-

waaren etter vereischt word, waardoor dezelve, met een alkalisch vogt of *Caustieke loog* in een taai Gelei veranderd word en dat, naar de mindere of meerdere levenskracht, of naar den van deeze levenskracht afhangenden, minderen of meerderen, graad van plaatslijke ontsteeking, het Gelei dunner of dikker word.

Wij zien eindelijk daaruit de ontbindende en smeltende kracht des etters, welke niet alleen in staat is de *coagulabele Lympha*, maar ook de Vezelen, het Celweeffel, te doen smelten. Maar kan dit alles dan ook in een leevendig ligchaam plaats hebben? Men raadpleege hier de ondervinding. Zien wij niet soms den slijm in de gedaante van etter veranderen?

Hoe veele waarneemingen schijnen ons dit niet te bevestigen, b. v. de catarrhaale slijm uit de neus en luchtpijp, — bij de slijmige witte vloed der vrouwen enz.? 't Is waar, deeze den etter gelijkende stoffen hebben alle de eigenschappen van den waaren vermeenden etter niet, welke nooit zonder bijkomende verhoogde levenskracht eene waare vormende natuur aanneemt. Maar echter worden ook soms de slijmafscheidende deelen voor eenen korten tijd in eenen staat van ontsteeking ge-



bragt en alzo naar den trap der ontsteeking en de verdere gesteldheid der werkende deelen en die der daarvan afhangende vogten, een volmaakte of onvolmaakte etter voortgebragt, welke alsdan zijne natuur ligt aan de overige afgescheiden vogten mededeelt en aan zich gelijk-aartig maakt. Indien 'er dus een onvolmaakte etter ontstaat, om dat de levenskracht niet toereikende, of verflauwd is, of om dat er gebrek is aan genoegsaame strembare *Lympha*, of dat deeze reeds te vooren ontaart is, terwijl de uitgestorte vogten in rust en warmte komen; dan kan de verdere chemische ontbinding ligtelijk de overhand neemen en hier door de etter, in plaats van herstellende te worden, ont-aarten in een vernielend vogt, hoedanig soort van etter dan niet wel met het proefmiddel in een taai Gelei zal overgaan. Evenwel toonen sommige proeven het tegendeel; men ziet naamelijk bij sommige lijders, bij welken de levenskracht zelfs geheel uitgeput schijnt te zijn, den ontlasten stinkenden etter soms zeer gemakkelijk door het proefmiddel in een taai Gelei overgaan. — Wat bewijst dit dan? En op welke wijze word het Gelei door het bijmengen van het Loogzout veroorzaakt? word door dit middel de door de ettering veranderde en als 't ware gesmoltene *Lympha* in haa-



haare oorspronkelijke eigenschap, de stolbaarheid (*Coagulabilitas*), weder hersteld? Of heeft het phosphorzuur bij den etter de overhand, welke door het Loogzout veranderd word? Dit vraag ik met GRASMEYER, die ook niet op zich wil neemen, om dit te verklaren, terwijl hij 'er nog bijvoegt: "zeer waarschijnlijk ligt in den etter een verborgen zuur, 't welk, wanneer het zelve een tijd lang buiten het ligchaam geweest en tot bederf overgegaan is, blijkbaarer word". Dit vindt men ook bevestigd door den Hoogleeraar BRUGMANS, in zijne voortreffelijke *Disfert. de Puogenia* § 17. Dit bewijzen ook sommige mijner proefneemingen. Maar, hoe kan het phosphorzuur bij den waaren en nog gezonden etter tegenwoordig zijn en de overhand hebben, dewijl dit zuur toch de verrotting bevordert, en de waare etter immers herstellende maar geenzins vernielende zijn moet? Zou mischien het phosphorzuur hier in een gebonden staat, ook in de plastische *Lympha*, huisvestende, nog vereenigd met het *Gas Oxygenneticum*, vrijgemaakt en dus de verbranding of ontbinding vermeerderd worden?

Dewijl wij dan dus den aart der smeltende en vernietigende werking van den bedorven etter door ondervinding en proeven genoegzaam



zaam hebben leeren kennen, zo spreekt het van zelve, dat men bijtijds dien etter moet trachten eenen weg naar buiten te baanen en niet eerst met weekmaakende pappen en pleisters denzelven tot eene gewaande rijpheid te brengen, waardoor toch zeer kwaade en onherstelbaare gevolgen kunnen ontstaan, welke door eene vroegtijdige opening hadden kunnen voorgekomen worden.

Zeer veele practische aanmerkingen zoude ik hier nog kunnen bijvoegen; dan ziende, dat deze Verhandeling reeds zeer is uitgedijd, en mij daar en boven ook de tijd ontbreekt om hier over verder uit te weiden, zal ik thans hiermede eindigen.

---







